Ноохолин Ромфарм



Код АТХ:

- N07AX02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Холина альфосцерат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета.

	1 мл	**1 амп.**
холина альфосцерат	250 мг	1 г

Вспомогательные вещества: вода д/и - до 1 мл.

4 мл - ампулы (3) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
4 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ноотропный препарат, холиномиметик центрального действия с преимущественным влиянием на ЦНС. Препарат содержит 40.5% метаболически защищенного холина. Холина альфосцерат в организме под влиянием ферментов головного мозга, расщепляется на холин и глицерофосфат. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, передавая нервные импульсы и улучшая работу головного мозга, а глицерофосфат является предшественником фосфатидилхолина мембран нейронов.

Холина альфосцерат улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом поражении головного мозга.

Результаты клинических исследований показали, что холина альфосцерат стимулирует дозозависимое выделение ацетилхолина в физиологических условиях нейротрансмиссии.

Фармакокинетика

Распределение

Легко проникает в различные ткани и органы, в т.ч. в головной мозг.

Выведение

Выводится преимущественно легкими в виде диоксида углерода (85%), а также выводится почками и через кишечник (15%).

Показания к применению:

— острый период черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем поражения;

— психоорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных изменений мозга;

— последствия цереброваскулярной недостаточности (нарушения мыслительной функции);

— мультиинфарктная деменция.

Относится к болезням:

- Деменция
- Психоорганический синдром
- Травмы
- Цереброваскулярная недостаточность
- Черепно-мозговая травма

Противопоказания:

— геморрагический инсульт (острая стадия);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м и в/в (медленно) по 1 г/сут в течение 15-20 дней. Затем переходят на прием холина альфосцерата перорально.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта, фарингит.

Со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, бессонница, агрессивность, тревога, нервозность, ишемия головного мозга, головокружение.

Со стороны кожных покровов: сыпь, крапивница.

Прочие: боль в месте введения, учащение мочеиспускания.

Передозировка:

Симптомы: в случае передозировки отмечается тошнота, которая проходит после уменьшения дозы или прекращения лечения.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и период лактации противопоказано.

На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Препарат не обладает тератогенным и мутагенным действием.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия холина альфосцерата с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении тошноты следует уменьшить дозу препарата Ноохолин Ромфарм.

Использование в педиатрии

Детям и подросткам младше 18 лет препарат следует назначать только после предварительной оценки общего состояния здоровья.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Ноохолин Ромфарм не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Детям и подросткам младше 18 лет препарат следует назначать только после предварительной оценки общего состояния здоровья.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Nooholin_Romfarm