

Ноокам



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с выраженным антигипоксическим, ноотропным и сосудорасширяющим эффектом.

Пирацетам активирует метаболические процессы в головном мозге посредством усиления энергетического и белкового обмена, ускорения утилизации глюкозы клетками и повышения их устойчивости к гипоксии; улучшает межнейрональную передачу в ЦНС, улучшает регионарный кровоток в ишемизированной зоне.

Циннаризин - селективный блокатор медленных кальциевых каналов, снижает поступление в клетки Ca^{2+} и уменьшает его содержание в депо плазмолеммы, снижает тонус гладкой мускулатуры артериол, уменьшает их реакцию на биогенные сосудосуживающие вещества (эпинефрин, норэпинефрин, дофамин, ангиотензин, вазопрессин, серотонин). Обладает сосудорасширяющим эффектом (особенно в отношении сосудов головного мозга, усиливая антигипоксическое действие пирацетама), не оказывая существенного влияния на АД. Проявляет умеренную антигистаминную активность, уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата, понижает тонус симпатической нервной системы. Повышает эластичность мембран эритроцитов, их способность к деформации, снижает вязкость крови.

Показания к применению:

- нарушение мозгового кровообращения (ишемический инсульт, восстановительный период после геморрагического инсульта);
- энцефалопатия при портальной гипертензии;
- коматозные и субкоматозные состояния после интоксикаций и травм головного мозга;
- заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций;
- депрессия;
- психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии;
- астения психогенного происхождения;
- лабиринтопатии;
- синдром Меньера;
- отставание интеллектуального развития у детей;

— профилактика мигрени и кинетозов.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипертензия](#)
- [Инсульт](#)
- [Интоксикация](#)
- [Ишемический инсульт](#)
- [Кома](#)
- [Мигрень](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Психоорганический синдром](#)
- [Травмы](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
- паркинсонизм;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст (до 5 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** - по 1-2 капс. или таб. 3 раза/сут в течение 2-3 мес; **детям** - по 1-2 капс. или таб. 1-2 раза/сут. Курс лечения - 1-3 мес.

При **ХПН (КК менее 60 мл/мин)** необходимо снижение дозы или увеличение интервала между приемом препарата.

Побочное действие:

Головная боль, нарушения сна, диспепсия, аллергические реакции (кожная сыпь).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказания: беременность; период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффекты ноотропных, гипотензивных лекарственных средств, средств, угнетающих ЦНС (в т.ч. этанола).

Улучшает переносимость антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков) и трициклических антидепрессантов.

Вазодилатирующие лекарственные средства усиливают действие.

Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения необходим контроль функции печени.

Ноокам

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автомобиля и занятиях видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказание — тяжелая почечная недостаточность.

При **ХПН (КК менее 60 мл/мин)** необходимо снижение дозы или увеличение интервала между приемом препарата.

При нарушениях функции печени

Противопоказание — тяжелая печеночная недостаточность.

В период лечения необходим контроль функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — детский возраст (до 5 лет).

Детям старше 5 лет - по 1-2 капс. или таб. 1-2 раза/сут. Курс лечения - 1-3 мес.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Nookam>