Нормазидол



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антидепрессант, обратимый ингибитор МАО типа А. Обладает умеренным активирующим эффектом. В отличие от трициклических антидепрессантов не обладает антихолинергической активностью.

Показания к применению:

Депрессии различного генеза, преимущественно с психомоторной заторможенностью, с тревожно-депрессивными или тревожно-бредовыми компонентами. Сенильная инволюционная депрессия. Алкогольная абстиненция.

Относится к болезням:

- Депрессия

Противопоказания:

Острые воспалительные заболевания печени, болезни кроветворной системы.

Способ применения и дозы:

Внутрь в начале лечения - 50-75 мг/сут в 2 приема, дозу постепенно увеличивают на 25-50 мг/сут. При дозах 150-300 мг/сут терапевтический эффект обычно проявляется к 7-14 дню. В случае необходимости и с учетом переносимости дозу можно увеличивать до 400 мг/сут в 2-3 приема. При достижении терапевтического эффекта лечение продолжают подобранной дозой еще 2-4 нед, а затем дозу постепенно уменьшают.

Побочное действие:

Редко: сухость во рту, повышенное потоотделение, тремор рук, тахикардия, тошнота, головокружение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении повышается эффективность эпинефрина.

Особые указания и меры предосторожности:

Пирлиндол не применяют одновременно с ингибиторами МАО и в течение 2 недель после их отмены.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при острых воспалительных заболеваниях печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Normazidol