

Нормоэнзим форте



Код АТХ:

- [A09A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гемицеллюлаза](#)
- [Желчи компоненты](#)
- [Панкреатин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** от светло-желтого до оранжево-желтого цвета, двояковыпуклые, допускается специфический запах.

	1 таб.
панкреатин с ферментативной активностью	
протеаз	600 ЕД. FIP
амилазы	9 тыс. ЕД. FIP
липазы	12 тыс. ЕД. FIP
сухой экстракт желчи	25 мг
гемицеллюлаза	50 мг

Вспомогательные вещества: пласдон К-25, сахар-рафинад, лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, зудрагит, диэтилфталат, макрогол 6000, тальк, титана диоксид, ванилин, тропеолин О.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Нормоэнзим форте - комбинированный ферментный препарат, улучшающий пищеварение, действие которого

обусловлено компонентами, входящими в его состав. Оказывает протеолитическое, амилалитическое и липолитическое действие. Имеет защитную оболочку, которая не растворяется до попадания в тонкий кишечник, что защищает ферменты от разрушающего действия желудочного сока. Препарат компенсирует недостаточность функции поджелудочной железы и желчевыделительной функции печени. Способствует быстрому и полному перевариванию пищи, устраняет симптомы, возникающие вследствие нарушения пищеварения (чувство тяжести и переполнения желудка, метеоризм, диарею). Улучшает процесс переваривания пищи у детей; стимулирует выделение собственных ферментов поджелудочной железы, желудка и тонкого кишечника, а также желчи.

Входящие в состав препарата ферменты - амилаза, липаза и протеаза - облегчают переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует более полному их всасыванию в тонком кишечнике. Компоненты желчи действуют желчегонно, способствуют эмульгированию жиров, ускоряют переваривание жиров, способствуют выделению липазы поджелудочной железой, улучшают всасывание жиров и жирорастворимых витаминов А, Е, К.

Фермент гемицеллюлаза расщепляет целлюлозу (составная часть растительных оболочек), что также способствует улучшению пищеварительных процессов, уменьшает брожение и образование газов в кишечнике.

Показания к применению:

- недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, фиброз);
- хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка (хронический гастрит), кишечника (энтероколиты), печени, желчного пузыря;
- состояния после резекции или облучения органов пищеварения, сопровождающиеся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);
- для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае нарушения в диете, а также при нарушениях жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни;
- подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости;
- метеоризм, диарея неинфекционного генеза.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диарея](#)
- [Метеоризм](#)
- [Панкреатит](#)
- [Фиброз](#)
- [Фиброма](#)
- [Энтерит](#)

Противопоказания:

- острый панкреатит, обострение хронического панкреатита;
- гепатит;
- печеночная недостаточность;
- печеночная кома или прекома;
- механическая желтуха;
- гипербилирубинемия;
- желчнокаменная болезнь;
- эмпиема желчного пузыря;
- кишечная непроходимость;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: муковисцидоз, беременность.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 1-3 таб. 3 раза/сут во время или сразу после еды. Проглатывают целиком, разжевывать нельзя. Продолжительность курса лечения может изменяться от нескольких дней (при затруднении пищеварения в связи с погрешностями в питании) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии). Перед рентгенологическим исследованием и УЗИ - по 2 таб. 2-3 раза/сут за 2-3 дня до исследования.

Побочное действие:

Редко при длительном применении возможны аллергические реакции повышенной чувствительности (гиперемия кожи, чиханье, слезотечение), снижение синтеза собственных желчных кислот, диарея, тошнота, боль в животе (в т.ч. кишечная колика). При длительном применении высоких доз препарата возможно развитие гиперурикемии и гиперурикозурии.

У детей (при приеме в больших дозах) - перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Передозировка:

Симптомы: гиперурикемия и гиперурикурия.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять с осторожностью во время беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уменьшает биодоступность препаратов железа. Повышает абсорбцию препаратов - производных парааминосалициловой кислоты (ПАСК), сульфаниламидов, антибиотиков. Циметидин усиливает действие препарата.

Антациды, содержащие ионы магния Mg^{2+} и/или кальция Ca^{2+} , снижают эффективность препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Противопоказания:

- гепатит;
- печеночная недостаточность;
- печеночная кома или прекома;
- гипербилирубинемия.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

У детей (при приеме в больших дозах) возможно перианальное раздражение, раздражение слизистой оболочки полости рта.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Normoenzim_forte