

## [Нурофен для детей](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Ибупрофен](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Суспензия для приема внутрь (апельсиновая)** белого или почти белого цвета, сиропобразной консистенции, с характерным апельсиновым запахом.

	<b>5 мл</b>
ибупрофен	100 мг

*Вспомогательные вещества:* сироп мальтитола, вода, глицерол, лимонная кислота, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия сахаринат, ароматизатор апельсиновый 2M16014, камедь ксантановая, полисорбат 80, домифена бромид.

100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцом-дозатором - коробки картонные.  
150 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцом-дозатором - коробки картонные.

◇ **Суспензия для приема внутрь (клубничная)** белого или почти белого цвета, сиропобразной консистенции, с характерным клубничным запахом.

	<b>5 мл</b>
ибупрофен	100 мг

*Вспомогательные вещества:* сироп мальтитола, вода, глицерол, лимонная кислота, натрия цитрат, натрия хлорид, натрия сахаринат, камедь ксантановая, ароматизатор клубничный 500244E, полисорбат 80, домифена бромид.

100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцем-дозатором - коробки картонные.  
150 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) в комплекте со шприцем-дозатором - коробки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

НПВП. Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Механизм действия ибупрофена обусловлен торможением биосинтеза простагландинов - медиаторов боли, воспаления. Действие препарата продолжается до 8 ч.

### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Нурофен для детей не предоставлены.

### **Показания к применению:**

Для детей с 3 месяцев жизни до 12 лет в качестве жаропонижающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях и состояниях, сопровождающихся повышением температуры тела, в т.ч. при:

- острых респираторных заболеваниях;
- гриппе;
- детских инфекциях;
- постпрививочных реакциях.

В качестве анальгезирующего средства при болевом синдроме слабой или умеренной интенсивности, в т.ч. при:

- головной боли;
- зубной боли;
- мигрени;
- невралгиях;
- боли в ушах и в горле;
- боли при растяжениях связок и других видах боли.

### **Относится к болезням:**

- [Болевой синдром](#)
- [Грипп](#)
- [Жар](#)
- [Инфекции](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Растяжение](#)

### **Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к ибупрофену и другим компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП;
- бронхиальная астма, крапивница, ринит, спровоцированные приемом ацетилсалициловой кислоты (салицилатами) или другими НПВП;
- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;
- активное желудочно-кишечное кровотечение;
- воспалительные заболевания кишечника;
- подтвержденная гипокералиемия;
- заболевания крови (гипокоагуляция, лейкопения, гемофилия);
- почечная и/или печеночная недостаточность;

## Нурофен для детей

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— снижение слуха.

*С осторожностью*

Перед применением препарата Нурофен для детей необходима консультация врача в следующих случаях:

— прием других анальгезирующих препаратов;

— указания в анамнезе на язвенную болезнь, гастрит, язвенный колит, кровотечения из ЖКТ;

— заболевания печени или почек;

— наличие *Helicobacter pylori*;

— бронхиальная астма, крапивница;

— прием непрямых антикоагулянтов, антигипертензивных препаратов, ГКС, антиагрегантов, диуретиков, препаратов лития, метотрексата.

## Способ применения и дозы:

Нурофен для детей - препарат, разработанный специально для детей.

Препарат принимают внутрь.

Доза зависит от массы тела ребенка.

При *лихорадке и болевом синдроме* препарат назначают по 5-10 мг/кг массы тела 3-4 раза/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 30 мг/кг массы тела.

Возраст	Масса тела	Режим дозирования	Максимальная суточная доза
3-6 мес	более 5 кг	по 50 мг (2.5 мл) 3 раза/сут	150 мг
6-12 мес	6-10 кг	по 50 мг (2.5 мл) 3-4 раза/сут	200 мг
1-3 лет	10-15 кг	по 100 мг (5 мл) 3 раза/сут	300 мг
4-6 лет	15-20 кг	по 150 мг (7.5 мл) 3 раза/сут	450 мг
7-9 лет	21-29 кг	по 200 мг (10 мл) 3 раза/сут	600 мг
10-12 лет	30-40 кг	300 мг (15 мл) 3 раза/сут	900 мг

Не превышать указанную дозу.

При *лихорадке после иммунизации* **детям в возрасте до 1 года** препарат назначают в дозе 50 мг (2.5 мл); **детям старше 1 года**, при необходимости, через 6 ч препарат можно назначить повторно в той же дозе.

Не применять более 5 мл в течение 24 ч.

*Продолжительность лечения:* в качестве жаропонижающего средства препарат не следует принимать более 3 дней, в качестве обезболивающего - не более 5 дней.

Если лихорадка (повышенная температура тела) сохраняется, то следует посоветоваться с врачом.

### Правила использования препарата

Суспензию перед употреблением следует тщательно взбалтывать.

Для точного дозирования суспензии к флакону прилагается мерный шприц. В 5 мл препарата содержится 100 мг ибупрофена.

1. Плотно вставить шприц в горлышко флакона.
2. Хорошо взболтать суспензию.
3. Перевернуть флакон вверх дном и плавно потянуть поршень вниз, набирая суспензию в шприц до нужной отметки.
4. Вернуть флакон в исходное положение и вынуть шприц, аккуратно поворачивая его.

5. Поместить шприц в ротовую полость ребенка и медленно нажимать на поршень, плавно выпуская суспензию.

После употребления следует промыть шприц в теплой воде и высушить его в недоступном для ребенка месте

### Побочное действие:

Побочные реакции наблюдаются редко, однако возможно появление следующих побочных эффектов.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, ощущение дискомфорта или боли в эпигастрии, диарея, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки и кровотечение из ЖКТ.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, крапивница, обострение бронхиальной астмы, ангионевротический отек, анафилактические реакции, анафилактический шок, бронхоспазм, лихорадка, многоформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение, бессонница.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, повышение АД.

*Со стороны системы кроветворения:* анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения.

*Со стороны мочевыделительной системы:* нарушение функции почек, цистит.

### Передозировка:

*Симптомы:* боли в животе, тошнота, рвота, головная боль, шум в ушах, метаболический ацидоз, кома, острая почечная недостаточность, снижение АД, брадикардия, тахикардия.

*Лечение:* промывание желудка (только в течение часа после приема), прием активированного угля, щелочное питье, форсированный диурез; симптоматическая терапия.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Нурофен для детей и антикоагулянтов возможно усиление действия последних.

При совместном применении Нурофен для детей повышает концентрацию в крови дигоксина, фенитоина, метотрексата, лития.

При одновременном применении препарата Нурофен для детей с диуретиками и антигипертензивными средствами возможно ослабление эффектов последних.

При совместном применении Нурофен для детей усиливает побочные эффекты минералокортикоидов и глюкокортикоидов.

### Особые указания и меры предосторожности:

Нурофен для детей можно применять у детей с сахарным диабетом, т.к. препарат не содержит сахара. Не содержит красителей.

Родителей ребенка необходимо проинформировать о том, что при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

#### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

С осторожностью и только по назначению врача следует применять препарат у детей в возрасте от 3 до 6 мес при наличии в анамнезе ребенка заболевания почек.

#### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

С осторожностью и только по назначению врача следует применять препарат у детей в возрасте от 3 до 6 мес при

## Нурофен для детей

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

наличии в анамнезе ребенка заболевания печени.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 3 мес.

<b>Возраст ребенка</b>	<b>Режим дозирования</b>	<b>Максимальная суточная доза</b>
3-6 мес	50 мг (2.5 мл) 3 раза/сут	150 мг
6-12 мес	50 мг (2.5 мл) 3-4 раза/сут	200 мг
1-3 лет	100 мг (5 мл) 3 раза/сут	300 мг
4-6 лет	150 мг (7.5 мл) 3 раза/сут	450 мг
7-9 лет	200 мг (10 мл) 3 раза/сут	600 мг
10-12 лет	300 мг (15 мл) 3 раза/сут	900 мг

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Nurofen\\_dlya\\_detey](http://drugs.thead.ru/Nurofen_dlya_detey)