Облепиховое масло



Код АТХ:

- D11A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Облепиховое масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Масло для приема внутрь и местного применения***	**1 фл.**
масло облепиховое	100 мл

50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) коричневого цвета - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (раневые, лучевые, ожоговые, язвенные). Оказывает общеукрепляющее действие, обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием. Уменьшает интенсивность свободно-радикальных процессов и защищает от

повреждения клеточные и субклеточные мембраны. Фармакологическое действие обусловлено наличием в препарате каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и других липофильных веществ.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек:

в гастроэнтерологии:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

в гинекологии:

— кольпит;

— эндоцервицит;

— эрозия шейки матки;

в оториноларингологии:

— послеоперационные раны с целью ускорения заживления;

в проктологии:

— наружный геморрой;

— трещины прямой кишки;

в хирургии:

— для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Геморрой
- Кольпит
- Кольпит
- Проктит
- Раны
- Эрозия шейки матки
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— детский возраст до 12 лет;

при применении внутрь:

— холецистит;

— холангит;

— панкреатит;

— холелитиаз;

— гепатит;

при ректальном введении:

— диарея;

при наружном и местном применении:

— профузное кровотечение;

— обильное гнойное отделяемое из раны.

С осторожностью: при приеме внутрь - беременность, детский возраст старше 12 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь, местно, наружно.

Внутрь: при *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки* препарат принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Местно: при *кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки* применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите -10-15 процедур, при эндоцервиците, эрозии шейки матки - 8-12 процедур, при наружном геморрое, трещинах прямой кишки - 5-7 процедур.

Наружно: при *поражениях кожи* применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций.

В *оториноларингологии* - при *тимпанопластике,* после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения -7-10 процедур.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции; при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика; при местном и наружном применении возможно ощущение жжения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Лечение проводится под наблюдением врача.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами,

работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oblepihovoe_maslo