

## Облепиховое масло



### **Код АТХ:**

- [D11A](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Облепиховое масло](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Масло для приема внутрь и местного применения</b> | <b>1 фл.</b> |
| масло облепиховое                                    | 100 мл       |

50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.  
100 мл - флаконы полиэтилентерефталатные (1) коричневого цвета - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек различной этиологии (раневые, лучевые, ожоговые, язвенные). Оказывает общеукрепляющее действие, обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием. Уменьшает интенсивность свободно-радикальных процессов и защищает от

## Облепиховое масло

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

повреждения клеточные и субклеточные мембраны. Фармакологическое действие обусловлено наличием в препарате каротина (провитамина А), токоферолов (витамина Е) и других липофильных веществ.

### Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

## Показания к применению:

В комплексной терапии в качестве ранозаживляющего средства при поражениях кожи и слизистых оболочек:

*в гастроэнтерологии:*

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

*в гинекологии:*

— кольпит;

— эндоцервицит;

— эрозия шейки матки;

*в оториноларингологии:*

— послеоперационные раны с целью ускорения заживления;

*в проктологии:*

— наружный геморрой;

— трещины прямой кишки;

*в хирургии:*

— для стимуляции репаративных процессов при раневых повреждениях кожи, лучевых поражениях, ожогах.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Геморрой](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Проктит](#)
- [Раны](#)
- [Эрозия шейки матки](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— детский возраст до 12 лет;

*при применении внутрь:*

— холецистит;

— холангит;

— панкреатит;

— холелитиаз;

— гепатит;

*при ректальном введении:*

---

## **Облепиховое масло**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— диарея;

*при наружном и местном применении:*

— профузное кровотечение;

— обильное гнойное отделяемое из раны.

*С осторожностью:* при приеме внутрь - беременность, детский возраст старше 12 лет.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, местно, наружно.

*Внутрь:* при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

*Местно:* при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, наружном геморрое, трещинах прямой кишки применяют в виде тампонов, обильно пропитанных облепиховым маслом. Курс лечения при кольпите -10-15 процедур, при эндоцервиците, эрозии шейки матки - 8-12 процедур, при наружном геморрое, трещинах прямой кишки - 5-7 процедур.

*Наружно:* при поражениях кожи применяют в виде масляных повязок. На предварительно очищенный от некротических тканей участок кожи наносят облепиховое масло, а затем накладывают ватно-марлевую повязку, которую меняют через день. Лечение проводят до появления грануляций.

*В оториноларингологии* - при тимпанопластике, после обработки раны антибиотиками или гидрокортизоном, тампонами, обильно пропитанными облепиховым маслом, тампонируют раневую поверхность. Курс лечения -7-10 процедур.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции; при приеме препарата внутрь - ощущение горечи во рту, диарея, желчная колика; при местном и наружном применении возможно ощущение жжения.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка:**

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Лечение проводится под наблюдением врача.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами,

## **Облепиховое масло**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказано детям до 12 лет.

### **Условия хранения:**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Oblepikhovoe\\_maslo](http://drugs.thead.ru/Oblepikhovoe_maslo)