

Оциллококцинум



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

◇ **Гранулы гомеопатические** белого цвета, почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в воде.

	1 доза
Anas barbariaeilium, hepatic et cordis extractum (анас барбариаэлиум, гепатик эт кордис экстрактум) 200K*	0.01 мл

Вспомогательные вещества: сахароза 850 мг, лактоза 150 мг.

* разведение по Корсакову.

1 доза - 1 г гранул - тубы из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена (3) - блистеры из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой (1) - пачки картонные с заклеивающимся по бокам "язычком".

1 доза - 1 г гранул - тубы из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена (3) - блистеры из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой (2) - пачки картонные с заклеивающимся по бокам "язычком".

1 доза - 1 г гранул - тубы из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена (3) - блистеры из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой (4) - пачки картонные с заклеивающимся по бокам "язычком".

Показания к применению:

- грипп легкой и средней степени тяжести;
- острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- непереносимость лактозы;
- дефицит лактазы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы:

Положить под язык содержимое тубы и держать до полного растворения.

Для **детей**: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской.

Принимать препарат Оциллококцидум за 15 мин до приема пищи или час спустя.

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при необходимости повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 часов.

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней.

Побочное действие:

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат применяется по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться к врачу.

Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение - с первых симптомов заболевания.

Как открыть упаковку: вытащить контейнер с 3 дозами из коробки, нажать на ячейку с прозрачной стороны, чтобы нарушить защиту, вытащить дозу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Оциллококцидум

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ocillokokcinum>