Одестон



Код АТХ:

- A05AX02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гимекромон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и гравировкой буквами "Ch" на одной стороне.

	1 таб.
гимекромон	200 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 45 мг, желатин - 3 мг, натрия лаурилсульфат - 1 мг, магния стеарат - 1 мг.

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
50 шт. - блистеры (1) - пачки картонные

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Желчегонный препарат. Увеличивает образование и выделение желчи. Оказывает селективное спазмолитическое действие в отношении желчных протоков и сфинктера Одди. Препарат не снижает перистальтику ЖКТ и АД.

Уменьшает застой желчи, предотвращает кристаллизацию холестерина и тем самым развитие холестаза.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение

После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. C_{max} в крови после приема внутрь достигается через 2-3 ч.

Слабо связывается с белками плазмы.

Выведение

$T_{1/2}$ составляет около 1 ч. Выводится с мочой: около 93% в виде глюкуроната, 1.4% - в виде сульфоната, 0.3% - в неизмененном виде.

Показания к применению:

— дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу;

— некалькулезный хронический холецистит, холангит, холелитиаз;

— состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчевыводящих путях;

— снижение аппетита, тошнота, запор, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Запор
- Рвота
- Тошнота
- Холангит
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— непроходимость желчевыводящих путей;

— почечная недостаточность;

— печеночная недостаточность;

— язвенный колит;

— болезнь Крона;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— гемофилия;

— детский возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь за 30 мин до еды.

Взрослым назначают по 200-400 мг 3 раза/сут. Суточная доза - 1200 мг. Курс лечения - 2 недели.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: диарея, метеоризм, абдоминальные боли, ульцерация слизистой оболочки ЖКТ.

Прочие: аллергические реакции, головная боль.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Одестон не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности и в период лактации.

Назначение Одестона при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) допустимо только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении морфин, вызывающий спазм сфинктера Одди, ослабляет действие Одестона.

При одновременном применении Одестона с метоклопрамидом отмечается взаимное ослабление действия.

Одестон усиливает эффекты непрямых антикоагулянтов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Odeston