

[Офломил](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Лак для ногтей 5 %.

2.5 мл, - флаконы темного стекла (1) /в комплекте с аппликаторами-6 шт., пилочками для ногтей-12 шт., саше с очищающими тампонами-12 шт./ - поддоны пластмассовые-пачки картонные.

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество:

Аморолфина гидрохлорид, 55,70 мг

в пересчёте на аморолфин 50,00 мг

Вспомогательные вещества:

Триацетин (глицерола триацетат) 10,50 мг

Метилметакрилата, триметиламмониетилметакрилата

хлорида и этилакрилата сополимер [2:0.2:1] (аммония

метакрилата сополимер (Тип А) (Eudragit: RL 100)) 125,00 мг

Этилацетат 150,00мг

Бутилацетат 50,00 мг

Этанол безводный до 1 мл

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для наружного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное повреждением цитоплазматической мембраны гриба путем нарушения биосинтеза стеролов. Снижает содержание эргостерола, накапливается содержание атипичных стерических неплоских стеролов. Обладает широким спектром действия. Высокоактивен в отношении как наиболее распространенных, так и редких

возбудителей грибковых поражений ногтей:

Дерматофитов: *Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*, *Epidermophyton spp.*

Дрожжевых грибов: *Candida spp.*, *Cryptococcus spp.*, *Malassezia spp.* (*Pityrosporum spp.*)

Плесневых грибов: *Altemaria spp.*, *Scopulariopsis spp.*, *Hendersonula spp.*

Грибов из семейства Dematiaceae: *Cladosporium spp.*, *Fonsecaea spp.*, *Wangiella spp.*

Диморфных грибов: *Coccidioides spp.*, *Histoplasma spp.*, *Sporothrix spp.*

Фармакокинетика

При нанесении на ногти проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе (практически полностью в течение первых 24 часов). Эффективная концентрация сохраняется в пораженной ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

Показания к применению:

- Лечение грибковых поражений ногтей, вызванных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами;
- Профилактика грибковых поражений ногтей.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Наносить на пораженные ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю следующим образом:

1. До применения препарата удалить по возможности пораженные участки ногтя (особенно на его поверхности) с помощью прилагаемой пилочки для ногтей.
 2. Затем поверхность ногтя очистить и обезжирить прилагаемым тампоном, смоченным спиртом.
- Обработку ногтей пилочкой и тампоном со спиртом необходимо проводить перед каждым применением препарата.
3. Обмакнуть лопаточку в лак. Лопаточку следует вынимать из флакона, не касаясь его горлышка, не следует стирать излишки лака о горлышко флакона.
 4. Лак нанести на всю поверхность пораженного ногтя с помощью лопаточки.
 5. Плотнo закрыть флакон сразу же после использования.

Вышеописанную процедуру повторить для каждого пораженного ногтя.

6. Дать лаку высохнуть примерно в течение 3-х минут.

7. Лопаточку протереть использованным тампоном. Избегать контакта обработанных ногтей и тампона. Использованный тампон выбросить.

Лечение следует непрерывно продолжать до регенерации ногтя и полного излечения пораженного участка.

Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев для ногтей на ногах.

Побочное действие:

Редко (в 0,01% - 0,1% случаев) возможно повреждение ногтя (изменение цвета, повышенная ломкость ногтевой пластинки), которое могут быть следствием грибкового поражения ногтя. Очень редко (менее 0,01% случаев) - легкое кратковременное чувство жжения в области ногтя после аппликации препарата, контактный дерматит.

Передозировка:

Офломил Лак - препарат для наружного применения с незначительной системной абсорбцией и передозировка маловероятна.

При случайном приеме препарата внутрь необходимо очистить желудок и немедленно обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

- Пилочки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей;
- Лица, работающие с органическими растворителями, должны надевать непроницаемые перчатки для защиты ногтей, покрытых лаком;
- Во время лечения следует избегать применения накладных искусственных ногтей и не пользоваться косметическим лаком для ногтей;
- Тампон содержит легко воспламеняющееся вещество;
- Следует избегать попадания препарата в глаза, на уши и слизистые оболочки;
- Пациентам с состояниями, предрасполагающими к развитию грибковых поражений ногтей (нарушение периферического кровообращения, сахарный диабет, иммунодефициты), а также пациентам с дистрофией ногтя или разрушенной ногтевой пластинкой следует обратиться к врачу.

Влияние на управление транспортными средствами и механизмами

Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения:

Срок годности:

2 года. Не использовать препарат по истечении срока годности.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oflomil>