Офтадек



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает бактерицидное действие в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Bacillus subtilis, Escherichia coli.

Показания к применению:

— острый, хронический конъюнктивит и блефароконъюнктивит;

— пред-, послеоперационный период, профилактика гнойно-воспалительных осложнений;

— обработка контактных линз .

Относится к болезням:

- Блефарит
- Блефароконъюнктивит
- Близорукость (миопия)
- Конъюнктивит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

При *острых гнойных конъюнктивитах*, после *офтальмологических операций* инстиллируют в виде 0.02% водного раствора по 4-5 кап в конъюнктивальный мешок 4-6 раз/сут.

При *хроническом конъюнктивите и блефароконъюнктивите* в конъюнктивальный мешок вводят по 2-3 кап 4-5 раз/сут.

С *профилактической целью*: за 1 день до операции - по 2-3 кап 4-6 раз в день и после операции - в течение 3-5 дней.

Для *обработки контактные линзы* погружают в 0.02% раствор на 10-15 мин, затем ополаскивают в стерильном 0.9% растворе натрия хлорида.

Побочное действие:

Аллергические реакции, кожная сыпь.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oftadek