

Офтадек



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает бактерицидное действие в отношении *Staphylococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*.

Показания к применению:

- острый, хронический конъюнктивит и блефароконъюнктивит;
- пред-, послеоперационный период, профилактика гнойно-воспалительных осложнений;
- обработка контактных линз .

Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Блефароконъюнктивит](#)
- [Близорукость \(миопия\)](#)
- [Конъюнктивит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

При *острых гнойных конъюнктивитах*, после *офтальмологических операций* инстиллируют в виде 0.02% водного раствора по 4-5 кап в конъюнктивальный мешок 4-6 раз/сут.

При *хроническом конъюнктивите и блефароконъюнктивите* в конъюнктивальный мешок вводят по 2-3 кап 4-5 раз/сут.

С *профилактической целью*: за 1 день до операции - по 2-3 кап 4-6 раз в день и после операции - в течение 3-5 дней.

Офтадек

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Для *обработки контактные линзы* погружают в 0.02% раствор на 10-15 мин, затем ополаскивают в стерильном 0.9% растворе натрия хлорида.

Побочное действие:

Аллергические реакции, кожная сыпь.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oftadek>