Офтагель



Код АТХ:

- S01XA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Карбомер

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель глазной*** бесцветный или слегка опалесцирующий.

	1 г	**10 г**
карбомер 974Р	2.5 мг	25 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид (0.06 мг/1 г), сорбитол, лизина моногидрат, натрия ацетат, поливиниловый спирт, вода д/и.

10 г - флаконы полиэтиленовые вместимостью 10 мл (1) с пипеткой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для увлажнения и защиты роговицы. Офтагель содержит карбомер, представляющий собой высокомолекулярный карбоксивинилполимер (полиакрилат). Карбомер увеличивает вязкость слезы, образуя

защитную увлажняющую пленку на поверхности роговицы, утолщает муциновый и водный слои слезной пленки. Офтагель уменьшает симптомы раздражения, связанные с синдромом сухого глаза, который включает компенсаторное слезотечение, зуд, жжение, ощущение инородного тела в глазу и зрительное утомление.

Длительный контакт слезной пленки с роговицей оказывает благоприятное воздействие при снижении секреции слезной жидкости. При одновременном применении Офтагель может пролонгировать всасывание других офтальмологических лекарственных средств.

Фармакокинетика

Из-за относительно большого размера молекулы карбомера проникновение через роговицу маловероятно.

Показания к применению:

Заболевания, сопровождающиеся синдромом сухого глаза, проявляющимся компенсаторным слезотечением, зудом, жжением, ощущением инородного тела в глазу, в т.ч.:

— сухой кератоконъюнктивит;

— раздражение глаз (в результате воздействия пыли, дыма, при работе на компьютере - "офисный глазной синдром");

— недостаточное слезоотделение;

— синдром Стивенса-Джонсона;

— болезнь Шегрена;

— заболевания век, приводящие к недостаточному контакту роговицы со слезой.

Восстановительная терапия после лазерных и хирургических вмешательств на роговице.

Относится к болезням:

- Зуд
- Кератит
- Кератоконус

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Офтагель закапывают по 1 капле 1-4 раза/сут в зависимости от степени выраженности симптомов.

Перед применением препарата необходимо вымыть руки; перед закапыванием Офтагеля голову следует наклонить назад, оттянуть нижнее веко и закапать 1 каплю геля в конъюнктивальный мешок между нижним веком и глазом.

Не следует касаться глаза и века кончиком пипетки. После применения препарата необходимо сразу закрыть флакон.

Побочное действие:

Местные реакции: сразу после закапывания возможны преходящее затуманивание зрения, кратковременное ощущение жжения и местное раздражение глаз.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Офтагель не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не проводилось адекватных контролируемых исследований применения препарата Офтагель у беременных.

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Офтагель с другими препаратами не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может абсорбироваться и обесцвечивать контактные линзы. Поэтому перед применением Офтагеля контактные линзы следует снять и установить вновь через 30 мин после закапывания препарата.

При необходимости назначения одновременно с Офтагелем других глазных капель Офтагель следует закапывать последним с интервалом не менее 15 мин.

Следует иметь в виду, что флакон с препаратом предназначен для использования только у одного человека.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Гель глазной Офтагель может вызывать кратковременное снижение остроты зрения. Перед началом вождения автомобиля или работы с механическими устройствами следует подождать, пока острота зрения полностью восстановится.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 30 мес. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После вскрытия флакон с препаратом следует хранить в картонной упаковке в перевернутом виде (для облегчения поступления геля). Срок годности после вскрытия флакона - 1 мес.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oftagel