

## Офтальмол



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Капли глазные</b>	<b>1 мл</b>
борная кислота	5 мг
дифенгидрамин	1 мг
цинка сульфат	2.5 мг

*Вспомогательные вещества:* гипромеллоза, макрогол, натрия цитрат, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Антисептический препарат для внутриконъюнктивального применения. Входящие в состав препарата цинка сульфат и борная кислота оказывают антисептическое и вяжущее действие.

Дифенгидрамин — антигистаминный препарат, блокирует высвобождение медиаторов проницаемости (брадикинина, серотонина, калликрейна и его производных), обеспечивая выраженное противоаллергическое и противовоспалительное действие. Кроме того, дифенгидрамин оказывает местноанестезирующий эффект.

Гипромеллоза (основной компонент "искусственной слезы") является протектором эпителия роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, обладает высокой вязкостью, что увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам. Способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки.

Полиэтиленоксид 4000 увеличивает время нахождения активных компонентов препарата в конъюнктивальной полости и улучшает переносимость препарата.

### Показания к применению:

- острый конъюнктивит;
- блефароконъюнктивит (в составе комплексной терапии);
- профилактика бактериальной инфекции при попадании инородного тела в конъюнктивальную полость;

## Офтальмол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— лечение аллергических конъюнктивитов.

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Блефарит](#)
- [Блефароконъюнктивит](#)
- [Близорукость \(миопия\)](#)
- [Инфекции](#)
- [Конъюнктивит](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- закрытоугольная глаукома.

### Способ применения и дозы:

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-4 раза в день. Курс лечения - 10-14 дней.

### Побочное действие:

При закапывании возможно раздражение глаз, которое проходит в течение нескольких минут.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность и эффективность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не исследовались.

### Особые указания и меры предосторожности:

Возможно кратковременное снижение зрения после закапывания препарата.

### Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

### Срок годности:

2 года.

### Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Oftalmol>