Офтальмол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные	**1 мл**
борная кислота	5 мг
дифенгидрамин	1 мг
цинка сульфат	2.5 мг

Вспомогательные вещества: гипромеллоза, макрогол, натрия цитрат, вода д/и.

5 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический препарат для внутриконьюнктивального применения. Входящие в состав препарата цинка сульфат и борная кислота оказывают антисептическое и вяжущее действие.

Дифенгидрамин — антигистаминный препарат, блокирует высвобождение медиаторов проницаемости (брадикинина, серотонина, калликреина и его производных), обеспечивая выраженное противоаллергическое и противовоспалительное действие. Кроме того, дифенгидрамин оказывает местноанестезирующий эффект.

Гипромеллоза (основной компонент "искусственной слезы") является протектором эпителия роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, обладает высокой вязкостью, что увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам. Способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки.

Полиэтиленоксид 4000 увеличивает время нахождения активных компонентов препарата в конъюнктивальной полости и улучшает переносимость препарата.

Показания к применению:

— острый конъюнктивит;

— блефароконъюнктивит (в составе комплексной терапии);

— профилактика бактериальной инфекции при попадании инородного тела в конъюнктивальную полость;

— лечение аллергических конъюнктивитов.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Блефарит
- Блефароконъюнктивит
- Близорукость (миопия)
- Инфекции
- Конъюнктивит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— закрытоугольная глаукома.

Способ применения и дозы:

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1–2 капли 2–4 раза в день. Курс лечения - 10–14 дней.

Побочное действие:

При закапывании возможно раздражение глаз, которое проходит в течение нескольких минут.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность и эффективность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не исследовались.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно кратковременное снижение зрения после закапывания препарата.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oftalmol