

## Офтолик Бк



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Капли глазные</b> без консерванта	<b>1 мл</b>
повидон	6 мг
поливиниловый спирт	14 мг

*Вспомогательные вещества:* динатрия эдетат, натрия хлорид, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота, вода д/и.

0.4 мл - тубик-капельницы (5) - пакеты из алюминиевой фольги (6) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Кератопротектор. Препарат оказывает защитное действие на роговицу глаза при пониженной секреции слезной жидкости или повышенном испарении слезной пленки.

Поливиниловый спирт и повидон обладают свойствами смазочного вещества, что уменьшает раздражение и покраснение глаза. Покрывая поверхность глаза, эти вещества снижают напряжение поверхности и предотвращают возникновение разрывов слезной пленки.

Поливиниловый спирт обладает свойствами, сходными со свойствами муцина, продуцируемого конъюнктивальными железами. Он способствует смягчению и смазыванию (увлажнению) поверхности глаза, повышает стабильность слезной пленки.

#### Фармакокинетика

Системная абсорбция препарата с поверхности глаза минимальна: после закапывания 2 кап. Офтолика в каждый глаз концентрация активных веществ препарата в плазме через 4 ч остается ниже возможного предела количественного определения (10 нг/мл).

### Показания к применению:

- чувство жжения, раздражения и дискомфорта, вызванные сухостью глаза;
- в качестве заменителей слезы в случае снижения секреции слезной жидкости;
- синдром сухого глаза;

— прочие состояния, требующие смягчения и/или увлажнения роговицы.

## Относится к болезням:

- [Синдром сухого глаза](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Назначают по 1-2 капли 3-4 раза/сут в оба глаза, в зависимости от выраженности симптомов.

### Правила применения препарата

Перед применением препарата вымыть руки. Встряхнуть флакон и удалить крышку. Убедиться, что кончик пипетки не касается кожи или поверхности глаза, чтобы не допустить инфицирования слизистой оболочки. Откинуть голову назад, оттянуть нижнее веко вниз, перевернуть флакон и закапать необходимое количество капель в конъюнктивальный мешок. После использования флакон следует плотно закрыть крышкой.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции к компонентам препарата.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет.

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Поливиниловый спирт подвергается реакции этерификации, характерной для соединений с вторичными гидроксигруппами. Он разрушается в сильных кислотах и размягчается или растворяется в слабых кислотах и щелочах. В высоких концентрациях поливиниловый спирт несовместим с неорганическими солями, особенно, фосфатами и сульфатами. Образование осадка 5% поливинилового спирта может быть вызвано реакцией с фосфатами. Образование геля из раствора поливинилового спирта может происходить в присутствии буры.

Раствор повидона совместим со многими неорганическими солями, натуральными и синтетическими смолами и другими веществами. Взаимодействует в растворе с сульфатиазолом, натрия салицилатом, салициловой кислотой, фенобарбиталом, танином и другими веществами. Эффективность некоторых консервантов (например, тиомерсал) может снижаться из-за формирования комплексов с повидоном.

## Особые указания и меры предосторожности:

Противопоказано использовать препарат, если изменился цвет раствора или он стал мутным. В целях предотвращения инфицирования слизистой оболочки глаза необходимо следить за тем, чтобы кончик пипетки во время применения препарата не касался кожи, поверхности глаза или других поверхностей.

Пациент должен прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом, если:

## **Офтолик Бк**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- при применении капель боль усиливается;
- ухудшается зрение;
- симптомы сохраняются более 72 ч;
- сохраняется покраснение и раздражение глаз.

Препарат содержит бензалкония хлорид, поэтому нельзя надевать контактные линзы в течение 20 мин после применения капель.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.

После вскрытия флакона препарат годен к употреблению в течение 1 месяца.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Oftolik\\_Bk](http://drugs.thead.ru/Oftolik_Bk)