# Окомистин



# Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Бензилдиметил3-(Benzyldimethyl3-myristoilamine)propylammonium chloride monohydrate)

### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahf},\Lambda}$ 

## Форма выпуска:

**Капли глазные 0.01%** в виде бесцветной, прозрачной жидкости.

100 мл
10 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

10 мл - флаконы полимерные с крышкой-капельницей (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Антисептический препарат для местного применения в офтальмологии.

Обладает выраженным противомикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам.

Активен в отношении хламидий, патогенных грибов, а также в отношении вирусов герпеса, аденовирусов.

Препарат более эффективен в отношении грамположительных бактерий, в т.ч. стафилококки, стрептококки.

Под действием препарата снижается устойчивость бактерий и грибов к антибиотикам.

#### Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Окомистин не предоставлены.

## Показания к применению:

- острый и хронический конъюнктивит;
- блефароконъюнктивит;
- кератит;
- кератоувеит;
- профилактика гнойно-воспалительных осложнений в предоперационном и послеоперационном периоде;
- травма глаза.

### Относится к болезням:

- Блефарит
- Блефароконъюнктивит
- Близорукость (миопия)
- Кератит
- Травмы

## Противопоказания:

- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

# Способ применения и дозы:

С лечебной целью препарат Окомистин закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-6 раз/сут до клинического выздоровления.

С профилактической целью препарат закапывают за 2-3 суток до операции, а также в течение 10-15 дней после операции по 1-2 капли 3 раза/сут.

## Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

*В отдельных случаях:* ощущение легкого жжения, дискомфорт, которые проходят самостоятельно через 15-20 сек и не требуют отмены препарата.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Окомистин не предоставлены.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Исследования взаимодействия препарата Окомистин с другими лекарственными средствами не проводилось.

## Особые указания и меры предосторожности:

Контактные линзы следует снимать непосредственно перед закапыванием препарата Окомистин и надевать не ранее чем через 15 мин после закапывания.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам следует воздержаться от вождения автотранспорта и от занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения, в течение 30 мин после закапывания в глаз.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности после вскрытия флакона - 1 мес.

# Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Okomistin