

## [Оксадол \(таблетки\)](#)



### **Код АТХ:**

- [N02BG06](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Нефопам](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Анальгетик центрального действия. Механизм действия, по-видимому, связан с влиянием на допаминовые, норадреналиновые и серотониновые рецепторы в ЦНС. Обладает некоторой м-холинолитической и симпатомиметической активностью. Химическая структура и свойства нефопама не позволяют отнести его ни к опиоидным анальгетикам, ни к НПВС. Не оказывает противовоспалительного и жаропонижающего действия. Не влияет на систему свертывания крови и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.

### **Показания к применению:**

Острый и хронический болевой синдром (в т.ч. головные боли, ревматические боли, боли в суставах и костях, боли внутренних органов), при подготовке к операции и в послеоперационном периоде, боли при травмах; зубная боль, обезболивание во время проведения стоматологических процедур и операций; для обезболивания родов и в послеродовом периоде.

### **Относится к болезням:**

- [Болевой синдром](#)
- [Боли в суставах](#)
- [Зубная боль](#)
- [Ревматизм](#)
- [Стоматит](#)

- [Травмы](#)

## **Противопоказания:**

Эпилепсия, указания в анамнезе на судорожный синдром, повышенная чувствительность к нефопаму.

## **Способ применения и дозы:**

Дозу устанавливают индивидуально. В зависимости от выраженности болевого синдрома принимают внутрь по 30-90 мг 3 раза/сут. В/м - по 20 мг 3-4 раза/сут. В/в вводят по 20 мг (в физиологическом растворе или растворе глюкозы) 3-4 раза/сут.

*Максимальная суточная доза* при приеме внутрь и при в/в введении составляет 120 мг.

Во время введения нефопам и в течение 15-20 мин после инъекции пациент должен находиться в положении лежа.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, сухость во рту.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, сонливость, нарушения сна, нервозность, нарушения мышления, головная боль, ощущение пелены перед глазами; в редких случаях - эйфория, галлюцинации, судороги.

*Прочие:* повышенное потоотделение, тахикардия, задержка мочи.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение нефопам при беременности и в период лактации возможно только в случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В *экспериментальных исследованиях* тератогенное действие нефопам не выявлено. Нефопам выделяется с грудным молоком.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют у пациентов с глаукомой, задержкой мочи, гипертрофией простаты, нарушениями функций печени или почек, при тахикардии, а также у лиц пожилого возраста.

Клинический опыт применения нефопам у пациентов с инфарктом миокарда недостаточен.

Не рекомендуется применять нефопам при одновременном лечении ингибиторами MAO. С осторожностью применять у пациентов, получающих антидепрессанты.

На фоне лечения возможно обратимое розовое окрашивание мочи, что не имеет клинического значения.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

С осторожностью применяют у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстрых психомоторных реакций.

### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции почек.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функций печени.

### **Применение в пожилом возрасте**

С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Oksadol\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Oksadol_tabletki)