# Оксамп-Натрий



## Код АТХ:

- J01CR50

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ампициллин
- Оксациллин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Порошок для приготовления раствора для в/м введения*** (или пористая масса) белого с желтоватым оттенком цвета, образующий при растворении прозрачный, почти бесцветный раствор.

| | **1 фл.** |
|---|---|
| ампициллин натрия | 333.33 мг |
| оксациллин натрия | 166.67 мг |

Флаконы объемом 10 мл (10) - коробки картонные.
Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

***Порошок для приготовления раствора для в/в введения*** (или пористая масса) белого с желтоватым оттенком цвета, образующий при растворении прозрачный, почти бесцветный раствор.

| | **1 фл.** |
|---|---|
| ампициллин натрия | 333.33 мг |
| оксациллин натрия | 166.67 мг |

Флаконы объемом 10 мл (10) - коробки картонные.
Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Показания к применению:

— инфекции дыхательных путей (в т.ч. бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь);

— заболевания желчевыводящих путей (в т.ч. холангит, холецистит);

— инфекции мочевыводящих путей и почек (в т.ч. пиелит, пиелонефрит, цистит);

— инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. инфицированные раны);

— ожоговая болезнь;

— ангина.

Профилактика послеоперационных осложнений при хирургических вмешательствах.

Профилактика и лечение инфекций у новорожденных.

## Относится к болезням:

- Ангина
- Бронхит
- Бронхоэктатическая болезнь
- Инфекции
- Инфекции мочевыводящих путей
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Пневмония
- Раны
- Холангит
- Холера
- Холецистит
- Цистит

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим антибиотикам из группы пенициллинов.

## Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м или в/в (струйно или капельно).

Разовая доза для **взрослых** составляет 0.5-1 г, суточная доза - 2-4 г.

**Новорожденным, недоношенным детям и детям в возрасте до 1 года** препарат назначают в суточной дозе 100-200 мг/кг массы тела; **1-7 лет** – 100 мг/кг/сут; **7-14 лет** – 50 мг/кг/сут; **подросткам старше 14 лет** назначают дозу для взрослых.

При *тяжелом течении инфекции* указанные дозы могут быть увеличены в 1.5-2 раза. Суточную дозу вводят в 3-4 приема с интервалом 6-8 ч. Длительность лечения от 5-7 дней до 3 недель и более.

В/в препарат вводят в течение 5-7 дней с последующим переходом (при необходимости) на в/м введение.

**Правила приготовления и введения растворов**

Растворы для в/м введения готовят непосредственно перед введением, добавляя к содержимому флакона 2 мл стерильной воды для инъекций.

Для в/в вливания препарат (разовую дозу) растворяют в 10-15 мл воды для инъекций или изотонического раствора натрия хлорида и вводят медленно в течение 2-3 мин.

Для в/в капельного введения для **взрослых** препарат (разовую дозу) растворяют в 100-200 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5-10% раствора декстрозы и вводят со скоростью 60-80 капель/мин. При капельном введении детям в качестве растворителя используют 5-10% раствор декстрозы (30-100 мл в зависимости от возраста).

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, отек Квинке; редко – анафилактический шок.

*Местные реакции:* при в/в введении возможно развитие флебитов и перифлебитов; при в/м введении – болезненность на месте инъекции.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Оксамп-натрий не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Оксамп-натрий при беременности по показаниям. Выделяется с грудным молоком в низких концентрациях.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Наблюдается синергизм антибактериального действия при комбинации препарата с бактерицидными антибиотиками - аминогликозидами, цефалоспоринами, ванкомицином, рифампицином.

## Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергических реакций необходимо прекратить введение препарата и провести десенсибилизирующую терапию.

При развитии анафилактического шока показано введение эпинефрина, ГКС (гидрокортизон или преднизолон), бронхолитиков, блокаторов гистаминовых $H_1$-рецепторов; при необходимости проводят ИВЛ.

*Использование в педиатрии*

С осторожностью следует назначать препарат детям, если в анамнезе матери имеется указание на повышенную чувствительность к пенициллинам. В таких случаях при необходимости назначения препарата Оксамп-натрий при наличии сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, сенная лихорадка и другие аллергические заболевания) показано одновременное применение десенсибилизирующих препаратов.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Oksamp-Natriy