

Оксамп-Натрий



Код АТХ:

- [J01CR50](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ампициллин](#)
- [Оксациллин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Порошок для приготовления раствора для в/м введения (или пористая масса) белого с желтоватым оттенком цвета, образующий при растворении прозрачный, почти бесцветный раствор.

	1 фл.
ампициллин натрия	333.33 мг
оксациллин натрия	166.67 мг

Флаконы объемом 10 мл (10) - коробки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

Порошок для приготовления раствора для в/в введения (или пористая масса) белого с желтоватым оттенком цвета, образующий при растворении прозрачный, почти бесцветный раствор.

	1 фл.
ампициллин натрия	333.33 мг
оксациллин натрия	166.67 мг

Флаконы объемом 10 мл (10) - коробки картонные.

Флаконы объемом 10 мл (50) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Показания к применению:

— инфекции дыхательных путей (в т.ч. бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь);

— заболевания желчевыводящих путей (в т.ч. холангит, холецистит);

- инфекции мочевыводящих путей и почек (в т.ч. пиелит, пиелонефрит, цистит);
- инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. инфицированные раны);
- ожоговая болезнь;
- ангина.

Профилактика послеоперационных осложнений при хирургических вмешательствах.

Профилактика и лечение инфекций у новорожденных.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Инфекции](#)
- [Инфекции мочевыводящих путей](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Пневмония](#)
- [Раны](#)
- [Холангит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Цистит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим антибиотикам из группы пенициллинов.

Способ применения и дозы:

Препарат вводят в/м или в/в (струйно или капельно).

Разовая доза для **взрослых** составляет 0.5-1 г, суточная доза - 2-4 г.

Новорожденным, недоношенным детям и детям в возрасте до 1 года препарат назначают в суточной дозе 100-200 мг/кг массы тела; **1-7 лет** - 100 мг/кг/сут; **7-14 лет** - 50 мг/кг/сут; **подросткам старше 14 лет** назначают дозу для взрослых.

При *тяжелом течении инфекции* указанные дозы могут быть увеличены в 1.5-2 раза. Суточную дозу вводят в 3-4 приема с интервалом 6-8 ч. Длительность лечения от 5-7 дней до 3 недель и более.

В/в препарат вводят в течение 5-7 дней с последующим переходом (при необходимости) на в/м введение.

Правила приготовления и введения растворов

Растворы для в/м введения готовят непосредственно перед введением, добавляя к содержимому флакона 2 мл стерильной воды для инъекций.

Для в/в вливания препарат (разовую дозу) растворяют в 10-15 мл воды для инъекций или изотонического раствора натрия хлорида и вводят медленно в течение 2-3 мин.

Для в/в капельного введения для **взрослых** препарат (разовую дозу) растворяют в 100-200 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5-10% раствора декстрозы и вводят со скоростью 60-80 капель/мин. При капельном введении детям в качестве растворителя используют 5-10% раствор декстрозы (30-100 мл в зависимости от возраста).

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, отек Квинке; редко - анафилактический шок.

Местные реакции: при в/в введении возможно развитие флебитов и перифлебитов; при в/м введении - болезненность на месте инъекции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Оксамп-натрий не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Оксамп-натрий при беременности по показаниям. Выделяется с грудным молоком в низких концентрациях.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Наблюдается синергизм антибактериального действия при комбинации препарата с бактерицидными антибиотиками - аминогликозидами, цефалоспоридами, ванкомицином, рифампицином.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергических реакций необходимо прекратить введение препарата и провести десенсибилизирующую терапию.

При развитии анафилактического шока показано введение эпинефрина, ГКС (гидрокортизон или преднизолон), бронхолитиков, блокаторов гистаминовых H₁-рецепторов; при необходимости проводят ИВЛ.

Использование в педиатрии

С осторожностью следует назначать препарат детям, если в анамнезе матери имеется указание на повышенную чувствительность к пенициллинам. В таких случаях при необходимости назначения препарата Оксамп-натрий при наличии сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, сенная лихорадка и другие аллергические заболевания) показано одновременное применение десенсибилизирующих препаратов.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oksamp-Natriy>