Оксиасе

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** мягкие желатиновые, продолговатые, коричневого цвета; содержимое капсул - пастообразная масса от кирпично-красного до коричневого цвета.

	1 капс.
бетакаротен (30% дисперсия)	10 мг,
что соотв. содержанию ретинола	5000 МЕ
токоферол	25 мг
аскорбиновая кислота	100 мг
медь (в форме сульфата)	1 мг
марганец (в форме сульфата)	1.5 мг
цинк (в форме сульфата)	7.5 мг
селен (в форме селенистой кислоты)	150 мкг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, масло арахисовое, масло растительное гидрированное, воск пчелиный белый, лецитин, желатиновая масса.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пакеты бумажные ламинированные трехслойные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пакеты бумажные ламинированные трехслойные (10) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оксиасе является комбинированным препаратом, содержащим поливитамины, минеральные вещества и микроэлементы, обладающие антиоксидантным действием.

Оксиасе защищает клетки и ткани организма от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, вызванных свободными радикалами, предохраняя их от преждевременного разрушения. При приеме препарата возрастает сопротивляемость организма к инфекциям и простудным заболеваниям, снижается риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повышается резистентность (сопротивляемость) организма к инфекциям. Оксиасе способствуют повышению умственной и физической работоспособности, улучшению памяти, замедляет развитие катаракты.

Фармакологическое действие препарата обусловлено составом входящих в него компонентов:

Бетакаротен в организме подвергается биотрансформации с образованием витамина А. Витамин А участвует в нормальном функционировании сетчатки глаза, обеспечивает целостность эпителиальных тканей, регулирует процессы регенерации волос и ногтей, регулирует рост костей.

Витамин Е тормозит перекисное окисление липидов клеточных мембран. Участвует в биосинтезе гема и белков, в процессах тканевого дыхания, в формировании волокон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов,

пищеварительного тракта, межклеточного вещества.

Витамин С активизирует синтез коллагена и дентина зубов, участвуют в метаболизме фолиевой кислоты и железа, играет важную роль в синтезе стероидных гормонов и катехоламинов, стимулирует синтез антител, интерферона.

Медь участвует в тканевом дыхании, процессах кроветворения, иммунных реакциях.

Марганец влияет на развитие костной ткани, участвует в тканевом дыхании, иммунных реакциях.

Цинк участвует в метаболизме нуклеиновых кислот, белков, жиров, углеводов, жирных кислот и гормонов.

Селен участвует в регуляции эластичности тканей, оказывает антиоксидантное действие.

Показания к применению:

— для профилактики и лечения гиповитаминозов и дефицита минеральных веществ и микроэлементов, обусловленных неполноценным питанием или нарушением их всасывания в организме;

— в период тяжелых физических или умственных нагрузок;

— при профилактике последствий стресса;

— в послеоперационный период, при ожоговой болезни;

— в период длительной антибиотико- или химиотерапии;

— для профилактики атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов;

— сахарный диабет;

— хронические дерматиты;

— снижение остроты зрения;

— злоупотребление алкоголем и никотином.

Относится к болезням:

- Атеросклероз
- Дерматит
- Сахарный диабет
- Тромбоз

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капс./сут после еды.

Побочное действие:

Аллергические реакции на компоненты препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов, снижает концентрацию пероральных контрацептивов. Уменьшает антикоагулянтный эффект производных кумарина.

Препараты кальция, колестирамин, неомицин уменьшают всасывание бетакаротена (витамина А).

Витамин Е усиливает эффект сердечных гликозидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных средств.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме Оксиасе не рекомендуется принимать одновременно другие поливитаминные препараты с микроэлементами.

Не превышайте рекомендуемую суточную дозу. При случайном применении высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oksiase