

Оксибупрокаин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капли глазные в виде прозрачной бесцветной жидкости.

	1 мл
оксибупрокаина гидрохлорид	4 мг

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат 0.1 мг, бензалкония хлорид 0.2 мг (эквивалентно 0.1 мг бензалкония хлорида), борная кислота 19 мг, натрия хлорид 8.0 мг, вода д/и до 1 мл.

5 мл - флаконы-капельницы пластиковые (1) - пачки картонные.

5 мл - флаконы-капельницы пластиковые (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Местный анестетик для применения в офтальмологии. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Показания к применению:

Для местной анестезии глаз.

Относится к болезням:

- [Анестезия](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к оксибупрокаину.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний и клинической ситуации.

Побочное действие:

Возможно: жжение, затуманивание зрения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

На фоне анестезирующего действия следует защищать глаза от пыли и бактериального загрязнения.

При длительном применении местного анестетика возможно повреждение роговицы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

После инстилляций не рекомендуется заниматься вождением автотранспорта и другими потенциально опасными видами деятельности до восстановления нормального зрения.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oksibuprokain>