

Оксолин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Мазь для наружного применения 3%	1 г
оксолин	30 мг
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные. 30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.	
♦ Мазь назальная 0.25%	1 г
оксолин	2.5 мг
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные. 30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.	

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа (преимущественно типа А2) с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Показания к применению:

- профилактика гриппа;
- вирусные заболевания кожи;
- вирусные риниты.

Относится к болезням:

- [Грипп](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата и его компонентов.

Способ применения и дозы:

Назально.

Профилактика гриппа и лечение вирусного ринита: смазывание 0.25% мазью слизистой оболочки носа 2-3 раза/сут.

Наружно.

Наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут. Для *удаления бородавок* наносят 3% мазь 2-3 раза/сут в течение 2 недель – 2 мес. После нанесения мази сверху накладывают вощаную бумагу.

Побочное действие:

При применении назальной мази Оксолин в некоторых случаях наблюдается быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея.

При нанесении мази на патологически измененную кожу может также появляться чувство жжения.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 5°C до 15°C, в недоступном для детей месте. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oksolin>