

## [Октанайн \(лиофилизат\)](#)



### **Код АТХ:**

- [B02BD04](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фактор свертывания крови ix](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Гематотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Гемостатическое средство, применяемое при гемофилии В. В процессе свертывания крови фактор свертывания IX активируется фактором XIa. Активная форма фактора свертывания IX - фактор IXa - в комбинации с фактором свертывания VIII активирует фактор X, который, в свою очередь, способствует переходу протромбина в тромбин и образованию фибринового сгустка.

#### **Фармакокинетика**

У пациентов с гемофилией В  $T_{1/2}$  составляет 1 сут.

### **Показания к применению:**

Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии В, приобретенной недостаточности фактора свертывания IX.

### **Относится к болезням:**

- [Гемофилия](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к фактору свертывания IX.

## **Способ применения и дозы:**

Дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от тяжести кровотечения. Вводят в/в в дозе 20-30 МЕ/кг при небольших спонтанных кровотечениях или для профилактики. При обширных травмах или хирургических вмешательствах доза составляет до 75 МЕ/кг.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* возможны озноб, лихорадка, крапивница.

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, рвота.

*Со стороны свертывающей системы крови:* сообщается о случаях внутрисосудистого свертывания и развития тромбозов при оперативных вмешательствах и у пациентов с заболеваниями печени.

*Прочие:* возможны головная боль, чувство жара.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В настоящее время отсутствует достаточный опыт применения фактора свертывания IX при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Фактор свертывания IX устраняет чрезмерное антикоагулирующее действие и кровотечения, вызванные варфарином.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями печени, в послеоперационном периоде, новорожденным и в других случаях повышенного риска развития тромбозов и ДВС. При подозрении или наличии ДВС-синдрома введение можно проводить только после купирования этого процесса, желательно в сочетании с антитромбином III.

Необходимо тщательное обоснование применения фактора свертывания IX у пациентов с гемофилией В со свежим тромбозом или острым инфарктом миокарда в случаях развития у них кровотечения.

На фоне введения необходимо контролировать степень повышения значений фактора свертывания IX, которая должна составлять в среднем 25% и не должна превышать 50%; частоту пульса до и во время введения фактора свертывания IX. При значительном учащении пульса необходимо замедлить скорость инфузии препарата или прекратить его введение.

Пациентам с аллергическими заболеваниями рекомендуется профилактическое назначение ГКС и антигистаминных средств. В случаях возникновения аллергических или анафилактических реакций следует немедленно прекратить введение и назначить соответствующую терапию.

При применении препаратов из крови или плазмы человека нельзя полностью исключить вероятность заражения инфекционными заболеваниями.

### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями печени.

### **Применение в детском возрасте**

С осторожностью применяют у новорожденных детей.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Oktanayn\\_liofilizat](http://drugs.thead.ru/Oktanayn_liofilizat)