Октенисепт



Код АТХ:

- D08AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для местного и наружного применения	**1 фл.**
октенидин	0.1 %
феноксиэтанол	2 %

50 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с механическим пульверизатором - пачки картонные.
250 мл - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
450 мл - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
1 л - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, липофильных вирусов, например, вируса Herpes simplex и вируса гепатита В, а также в отношении дрожжеподобных грибов и дерматофитов.

Показания к применению:

— обработка кожи и слизистых оболочек перед диагностическими и оперативными мероприятиями в педиатрической, хирургической и акушерско-гинекологической практике, в травматологии, проктологии, дерматовенерологии, отоларингологии, стоматологии;

— для обработки раневых и ожоговых поверхностей;

— для профилактики микозов стоп и межпальцевых микозов;

Относится к болезням:

- Дерматит
- Микоз
- Проктит
- Стоматит
- Травмы

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Местно.

Обрабатываемый участок поочередно обрабатывают 2 тампонами, обильно смоченными препаратом. Пораженная поверхность должна быть обработана полностью. На легко доступные участки препарат можно наносить путем распыления. Время экспозиции не менее 1-2 минут.

Для *полоскания полости рта* используется 20 мл препарата, повторное полоскание рекомендуется производить через 20 секунд.

Для *профилактики грибковых заболеваний* кожу между пальцами ног и стопы обрабатывают препаратом 2 раза в день (утром и вечером). Срок лечения - до 14 дней.

В **детской практике** без возрастных ограничений.

Побочное действие:

Возможно кратковременное жжение в месте применения. При полоскании полости рта возможен горький привкус.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не использовать совместно с йодсодержащими антисептиками.

Особые указания и меры предосторожности:

Не глотать.

Применение в детском возрасте

В детской практике без возрастных ограничений.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С, в защищенном от света месте, недоступном для детей. Срок годности - раствор во флаконах по 250 мл, 450 мл и 1 л - 5 лет; раствор во флаконах по 50 мл с механическим пульверизатором - 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oktenisept