

Октилия



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тетризолин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные.

	1 мл
тетризолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия фосфата декагидрат, калия дигидрофосфат, натрия хлорид, натрия эдетат, вода дистиллированная, вода дистиллированная ромашковая, вода дистиллированная липовая, полисорбат 80, вода очищенная.

8 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с сосудосуживающим действием для местного применения в офтальмологии. Тетризолина гидрохлорид - альфа-адреномиметик, производное имидазола. Оказывает выраженное сосудосуживающее действие, уменьшает отек и гиперемия слизистых оболочек.

Экстракты ромашки и липы оказывают противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии при лечении заболеваний глаз, сопровождающихся симптомами раздражения, вызванных аллергическими, химическими и физическими факторами (дым, пыль, сильное освещение, отражение света от снежных и водных поверхностей, от излучающих экранов мониторов).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)

Противопоказания:

- глаукома;
- синдром сухого глаза;
- эпителиально-эндотелиальные дистрофии роговицы;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует назначать препарат при повышении АД, ИБС, аритмиях, аневризме, тяжелых органических заболеваниях сердца и сосудов, гипертиреозе, феохромоцитоме, сахарном диабете, в период лечения ингибиторами МАО и другими препаратами, повышающими АД, антидепрессантами, при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Препарат закапывать по 1-2 капли в нижний конъюнктивальный мешок 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Местные реакции: мидриаз, повышение внутриглазного давления, чувство жжения, реактивная конъюнктивальная гиперемия.

Системные реакции: головная боль, тошнота, сонливость, слабость, тремор, головокружение, бессонница, сердцебиение, тахикардия, гипергликемия, повышение АД, нарушение деятельности сердца, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: цианоз, лихорадка, судороги, аритмии, остановка сердца, повышение АД, отек легких, диспноэ, угнетение ЦНС, сопровождающееся сонливостью, гипотермией, брадикардией, коллапсом, апноэ и комой.

Следует учитывать, что риск развития передозировки высок у маленьких детей, особенно при проглатывании.

Лечение: антидот неизвестен. Назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противоэпилептические средства.

Для снижения АД назначают фентоламин в дозе 5 мг медленно в/в или 100 мг внутрь.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать препарат Октилия при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Октилия не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять непрерывно более 4 дней без консультации офтальмолога.

Если в течение 2 дней симптомы заболевания сохраняются или становятся более выраженными, необходима консультация офтальмолога.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, т.к. при его случайном проглатывании возможно развитие системного действия препарата.

Октилия

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Пациенты, использующие контактные линзы, должны применять Октилию только при снятых линзах. Установить линзы можно через 15 минут после закапывания препарата.

Препарат не следует применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 10 дней после прекращения их приема.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия упаковки препарат следует хранить не более 28 дней.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

4 года.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Oktilya>