Октилия

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Тетризолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные бесцветные или светло-желтого цвета, прозрачные.

	1 мл
тетризолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия фосфата декагидрат, калия дигидрофосфат, натрия хлорид, натрия эдетат, вода дистиллированная, вода дистиллированная ромашковая, вода дистиллированная липовая, полисорбат 80, вода очищенная.

8 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с сосудосуживающим действием для местного применения в офтальмологии. Тетризолина гидрохлорид - альфа-адреномиметик, производное имидазола. Оказывает выраженное сосудосуживающее действие, уменьшает отек и гиперемию слизистых оболочек.

Экстракты ромашки и липы оказывают противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии при лечении заболеваний глаз, сопровождающихся симптомами раздражения, вызванных аллергическими, химическими и физическими факторами (дым, пыль, сильное освещение, отражение света от снежных и водных поверхностей, от излучающих экранов мониторов).

Относится к болезням:

- Аллергия

Противопоказания:

— глаукома;

— синдром сухого глаза;

— эпителиально-эндотелиальные дистрофии роговицы;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при повышении АД, ИБС, аритмиях, аневризме, тяжелых органических заболеваниях сердца и сосудов, гипертиреозе, феохромоцитоме, сахарном диабете, в период лечения ингибиторами МАО и другими препаратами, повышающими АД, антидепрессантами, при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Препарат закапывать по 1-2 капли в нижний конъюнктивальный мешок 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Местные реакции: мидриаз, повышение внутриглазного давления, чувство жжения, реактивная конъюнктивальная гиперемия.

Системные реакции: головная боль, тошнота, сонливость, слабость, тремор, головокружение, бессонница, сердцебиение, тахикардия, гипергликемия, повышение АД, нарушение деятельности сердца, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: цианоз, лихорадка, судороги, аритмии, остановка сердца, повышение АД, отек легких, диспноэ, угнетение ЦНС, сопровождающееся сонливостью, гипотермией, брадикардией, коллапсом, апноэ и комой.

Следует учитывать, что риск развития передозировки высок у маленьких детей, особенно при проглатывании.

Лечение: антидот неизвестен. Назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислорода, жаропонижающие и противоэпилептические средства.

Для снижения АД назначают фентоламин в дозе 5 мг медленно в/в или 100 мг внутрь.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать препарат Октилия при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Октилия не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не следует применять непрерывно более 4 дней без консультации офтальмолога.

Если в течение 2 дней симптомы заболевания сохраняются или становятся более выраженными, необходима консультация офтальмолога.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, т.к. при его случайном проглатывании возможно развитие системного действия препарата.

Пациенты, использующие контактные линзы, должны применять Октилию только при снятых линзах. Установить линзы можно через 15 минут после закапывания препарата.

Препарат не следует применять одновременно с ингибиторами МАО и в течение 10 дней после прекращения их приема.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. После вскрытия упаковки препарат следует хранить не более 28 дней.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

4 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oktiliya