Олететрин



Код АТХ:

- J01RA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Олеандомицин
- Тетрациклин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Показания к применению:

— пневмония;

— фарингит;

— тонзиллит;

— синусит;

— бронхоэктатическая болезнь;

— средний отит;

— бронхит;

— холецистит;

— пиелонефрит;

— цистит;

— эндометрит;

— простатит;

— рожистое воспаление;

— гнойный менингит;

— инфекции мочеполовых органов;

— гонорея;

— туляремия;

— бруцеллез;

— гнойные инфекции кожи и мягких тканей;

— остеомиелит

и другие заболевания, вызванные чувствительными к компонентам препарата микроорганизмами.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Бронхоэктатическая болезнь
- Воспаление
- Гонорея
- Инфекции
- Менингит
- Остеомиелит
- Отит
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Пневмония
- Простатит
- Синусит
- Тонзиллит
- Фарингит
- Холера
- Холецистит
- Цистит
- Эндометрит

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— беременность;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— лейкопения;

— микозы;

— детский возраст (до 8 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** - по 0.25 г 4 раза/сут; максимальная суточная доза - 2 г. **Детям старше 8 лет** - в суточной дозе 20-30 мг/кг; кратность приема - 4 раза.

В/м, суточная доза **для взрослых** - 0.2-0.3 г; кратность введения - 2-3 раза. Для **детей старше 8 лет** суточная доза составляет 10-20 мг/кг. В/в струйно, **взрослым** - 0.2-0.3 г в дистиллированной или бидистиллированной воде; скорость введения - 2 мл/мин. В/в капельно - 0.1% раствор в 0.9% растворе натрия хлорида или в 5% растворе декстрозы со скоростью 60 кап/мин.

Курс лечения составляет 5-10 дней, в зависимости от тяжести заболевания.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, снижение аппетита, боль в животе, запоры или диарея, дисфагия, глоссит, эзофагит, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, эозинофилия).

При длительном применении: кандидоз, кишечный дисбактериоз, развитие в организме дефицита витаминов группы B и K, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз, гиперкреатининемия, азотемия; гипербилирубинемия, фотосенсибилизация.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственные средства и пищевые продукты, содержащие Ca^{2+}, Al^{3+} и/или Mg^{2+}, Fe (антациды, препараты Fe, молоко и молочные продукты), снижают абсорбцию.

Особые указания и меры предосторожности:

Назначение в период развития зубов может стать причиной необратимого изменения их цвета.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oletetrin