

## Олететрин



### **Код АТХ:**

- [J01BA](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Олеандомицин](#)
- [Тетрациклин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Показания к применению:**

- пневмония;
- фарингит;
- тонзиллит;
- синусит;
- бронхоэктатическая болезнь;
- средний отит;
- бронхит;
- холецистит;
- пиелонефрит;
- цистит;
- эндометрит;
- простатит;
- рожистое воспаление;

- гнойный менингит;
- инфекции мочеполовых органов;
- гонорея;
- туляремия;
- бруцеллез;
- гнойные инфекции кожи и мягких тканей;
- остеомиелит

и другие заболевания, вызванные чувствительными к компонентам препарата микроорганизмами.

### Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Бронхоэктатическая болезнь](#)
- [Воспаление](#)
- [Гонорея](#)
- [Инфекции](#)
- [Менингит](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Отит](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Пневмония](#)
- [Простатит](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)
- [Цистит](#)
- [Эндометриит](#)

### Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- беременность;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- лейкопения;
- микозы;
- детский возраст (до 8 лет).

### Способ применения и дозы:

Внутрь, **взрослым** - по 0.25 г 4 раза/сут; максимальная суточная доза - 2 г. **Детям старше 8 лет** - в суточной дозе 20-30 мг/кг; кратность приема - 4 раза.

В/м, суточная доза **для взрослых** - 0.2-0.3 г; кратность введения - 2-3 раза. Для **детей старше 8 лет** суточная доза составляет 10-20 мг/кг. В/в струйно, **взрослым** - 0.2-0.3 г в дистиллированной или бидистиллированной воде; скорость введения - 2 мл/мин. В/в капельно - 0.1% раствор в 0.9% растворе натрия хлорида или в 5% растворе декстрозы со скоростью 60 кап/мин.

Курс лечения составляет 5-10 дней, в зависимости от тяжести заболевания.

### Побочное действие:

## **Олететрин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Тошнота, рвота, снижение аппетита, боль в животе, запоры или диарея, дисфагия, глоссит, эзофагит, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, эозинофилия).

При длительном применении: кандидоз, кишечный дисбактериоз, развитие в организме дефицита витаминов группы В и К, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз, гиперкреатининемия, азотемия; гипербилирубинемия, фотосенсибилизация.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственные средства и пищевые продукты, содержащие  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$  и/или  $\text{Mg}^{2+}$ , Fe (антациды, препараты Fe, молоко и молочные продукты), снижают абсорбцию.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Назначение в период развития зубов может стать причиной необратимого изменения их цвета.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Oletetrin>