Олиговит

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины
- Минералы

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** красного цвета.

	1 таб.
ретинол	5000 МЕ
колекальциферол	500 МЕ
тиамин (в форме хлорида)	5 мг
рибофлавин	5 мг
никотинамид	50 мг
аскорбиновая кислота	100 мг
пиридоксин (в форме гидрохлорида)	2.5 мг
кальция пантотенат	10 мг
цианокобаламин	2.5 мкг
токоферол (в форме ацетата)	12.5 мг
кальция фосфат двухосновной	200 мг
фтор (в форме натрия фторида)	500 мкг
железо (в форме сульфата)	10 мг
медь (в форме сульфата)	500 мкг
марганец (в форме сульфата)	500 мкг
магний (в форме оксида)	3 мг
кобальт (в форме сульфата)	50 мкг
цинк (в форме сульфата)	750 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	100 мкг
калий (в форме сульфата)	2.5 мг

Вспомогательные вещества: желатин пищевой, нипагин, стеариновая кислота, лактоза, крахмал картофельный, тальк, эудрагит L, эудрагит S, шеллак, сахар, гуммиарабик, воск белый, воск карнаубский, красители.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

[I] - Инструкция по медицинскому применению одобрена фармакологическим комитетом МЗ РФ

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено эффектами входящих в его состав витаминов и минеральных веществ, являющихся важными факторами метаболических процессов.

Показания к применению:

Применяют для профилактики и лечения гипо— и авитаминозов и дефицита минеральных веществ при:

— неполноценном и несбалансированном питании;

— в период выздоровления после перенесенных заболеваний;

— беременности и кормлении грудью;

— чрезмерной физической и умственной нагрузке, интенсивных занятиях спортом.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— не рекомендуется длительно применять с другими лекарственными средствами, содержащими эти витамины, так как возможно накопление и в связи с этим передозировка витаминов A, D.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь после еды. **Взрослым** и **детям старше 12 лет** назначают по 1 таб 1 раз в день. В *период беременности, кормления грудью, при тяжелой физической нагрузке, в период выздоровления после перенесенных заболеваний* доза препарата может быть увеличена до 2 таб. в день. Курс лечения - 3-4 недели. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяют по показаниям.

Условия хранения:

Хранить в холодном, сухом, защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности — 2 г с момента выпуска.

Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Oligovit