

## Олопаталлерг



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Капли глазные** в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	<b>1 мл</b>
олопатадина гидрохлорид	1.1 мг,
что соответствует содержанию олопатадина	1 мг

Вспомогательные вещества: динатрия фосфата додецигидрат - 12.5 мг, натрия хлорид - 6.5 мг, бензалкония хлорид - 0.1 мг, натрия гидроксида раствор 1М/хлористоводородной кислоты раствор 1М - до pH 7.1±0.1, вода очищенная - до 1 мл.

5 мл - флаконы-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Селективный блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, также ингибитирует высвобождение медиаторов воспаления из тучных клеток. Оказывает выраженное противоаллергическое действие.

Не оказывает влияния на α-адренорецепторы, допаминовые рецепторы, M<sub>1</sub>- и M<sub>2</sub>-холинорецепторы, а также на серотониновые рецепторы.

#### **Фармакокинетика**

При местном применении системная абсорбция низкая. C<sub>max</sub> олопатадина в плазме крови достигается в течение 2 ч после местного применения и составляет от 0.5 нг/мл и менее до 1.3 нг/мл. T<sub>1/2</sub> в плазме составляет 3 ч. Выводится преимущественно почками, 60-70% выводится в неизмененном виде.

### **Показания к применению:**

Аллергический конъюнктивит.

### **Относится к болезням:**

- Конъюнктивит

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к олопатадину.

**Способ применения и дозы:**

Закапывают в конъюнктивальный мешок 1-2 раза/сут, в зависимости от применяемой лекарственной формы.

**Побочное действие:**

*Местные реакции:* менее 5% - затуманивание зрения, жжение и боль в глазах, слезотечение, ощущение инородного тела в глазу, гиперемия конъюнктивы, кератит, ирит, припухлость век.

*Системные реакции:* 0.1-1% - слабость, головная боль, головокружение, тошнота, фарингит, ринит, синусит, изменение вкуса.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или грудного ребенка.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Анафилактический шок
- Отек Квинке
- Сенная лихорадка

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Olopatallerg>