

## Омепразол Сандоз



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Ингибитор H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-АТФ-азы. Тормозит активность H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-АТФ-азы в париетальных клетках желудка и блокирует тем самым заключительную стадию секреции соляной кислоты. Это приводит к снижению уровня базальной и стимулированной секреции, независимо от природы раздражителя. Вследствие снижения секреции кислоты уменьшает или нормализует воздействие кислоты на пищевод у пациентов с рефлюкс-эзофагитом.

Омепразол оказывает бактерицидный эффект на *Helicobacter pylori*. Эрадикация *H. pylori* при одновременном применении омепразола и антибиотиков позволяет быстро купировать симптомы заболевания, достичь высокой степени заживления поврежденной слизистой и стойкой длительной ремиссии и уменьшить вероятность развития кровотечения из ЖКТ.

#### **Фармакокинетика**

При приеме внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Проникает в париетальные клетки слизистой оболочки желудка. Связывание с белками плазмы около 95%, преимущественно с альбуминами. Биотрансформируется в печени. Выводится почками - 72-80%, с калом - около 20%. T<sub>1/2</sub> 0.5-1 ч. У пациентов с хроническими заболеваниями печени T<sub>1/2</sub> увеличивается до 3 ч.

### **Показания к применению:**

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения (в т.ч. ассоциированная с *Helicobacter pylori*), рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера - Эллисона, эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС.

### **Относится к болезням:**

- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)

### **Противопоказания:**

Хронические заболевания печени (в т.ч. в анамнезе), повышенная чувствительность к омепразолу.

## **Способ применения и дозы:**

Индивидуальный. При приеме внутрь разовая доза составляет 20-40 мг. Суточная доза - 20-80 мг; частота применения - 1-2 раза/сут. Продолжительность лечения - 2-8 недель.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - тошнота, диарея, запор, боли в животе, метеоризм.

*Со стороны ЦНС:* редко - головная боль, головокружение, слабость.

*Со стороны системы кроветворения:* в отдельных случаях - анемия, эозинопения, нейтропения, тромбоцитопения.

*Со стороны мочевыделительной системы:* в отдельных случаях - гематурия, протеинурия.

*Со стороны костно-мышечной системы:* в отдельных случаях - артралгия, мышечная слабость, миалгия.

*Аллергические реакции:* редко - кожная сыпь.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

В связи с отсутствием клинического опыта омепразол не рекомендуется применять при беременности. При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении описаны случаи развития симптомов токсического действия бензодиазепинов, что связано с угнетением активности изоферментов CYP3A и, по-видимому, CYP2C9.

При одновременном применении с атракурия безилатом пролонгируются эффекты атракурия безилата.

При одновременном применении с висмута, трикалия дицитратом возможно нежелательное повышение абсорбции висмута.

При одновременном применении с дигоксином возможно небольшое повышение концентрации омепразола в плазме крови.

При одновременном применении с дисульфирамом описан случай нарушения сознания и кататонии; с индинавиром - возможно уменьшение концентрации индинавира в плазме крови; с кетоконазолом - уменьшение абсорбции кетоконазола.

При длительном одновременном применении с кларитромицином происходит повышение концентраций омепразола и кларитромицина в плазме крови.

Описаны случаи уменьшения выведения метотрексата из организма у пациентов, получающих омепразол.

При одновременном применении с теофиллином возможно небольшое повышение клиренса теофиллина.

Полагают, что при одновременном применении омепразола в высоких дозах и фенитоина возможно повышение концентрации фенитоина в плазме крови.

Описаны случаи повышения концентрации циклоsporина в плазме крови при одновременном применении с циклоsporином.

При одновременном применении с эритромицином описан случай повышения концентрации омепразола в плазме крови, при этом эффективность омепразола уменьшалась.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед началом терапии необходимо исключить возможность наличия злокачественного процесса (особенно при язве желудка), т.к. лечение омепразолом может замаскировать симптоматику и отсрочить правильную диагностику.

На фоне применения омепразола возможно искажение результатов лабораторных исследований функции печени и показателей концентрации гастрина в плазме крови.

## **Омепразол Сандоз**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### *Использование в педиатрии*

В связи с отсутствием опыта клинического применения омепразол не рекомендуется применять у детей.

### **При нарушениях функции печени**

Противопоказан при хронических заболеваниях печени (в т.ч. в анамнезе).

### **Применение в детском возрасте**

В связи с отсутствием опыта клинического применения омепразол не рекомендуется применять у детей.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Omeprazol\\_Sandoz](http://drugs.thead.ru/Omeprazol_Sandoz)