

Омнопон



Код АТХ:

- [N02AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кодеин](#)
- [Морфин](#)
- [Носкапин](#)
- [Папаверина гидрохлорид](#)
- [Тебаин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, опиоидный анальгетик. Обладает выраженным анальгезирующим и спазмолитическим действием.

Показания к применению:

Болевой синдром (различной этиологии):

- кишечная колика;
- желчная колика;
- почечная колика.

Относится к болезням:

- [Желчная колика](#)
- [Кишечная колика](#)
- [Кишечные колики](#)
- [Почечная колика](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- дыхательная недостаточность;
- пожилой возраст;
- кахексия;
- травма черепа;
- геморрагический инсульт;
- острые заболевания внутренних органов до установления диагноза;
- беременность.

Способ применения и дозы:

П/к, **взрослым** - по 1 мл 1-2% раствора. Высшие дозы: разовая - 0.03 г, суточная - 0.1 г.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, запоры, угнетение дыхательного центра, задержка мочи, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание — беременность.

Особые указания и меры предосторожности:

Могут развиваться привыкание и наркотическая зависимость.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в пожилом возрасте

Противопоказание — пожилой возраст.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Omnopon>