Омнопон



Код АТХ:

- N02AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кодеин
- Морфин
- Носкапин
- Папаверина гидрохлорид
- Тебаин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, опиоидный анальгетик. Обладает выраженным анальгезирующим и спазмолитическим действием.

Показания к применению:

Болевой синдром (различной этиологии):

— кишечная колика;

— желчная колика;

— почечная колика.

Относится к болезням:

- Желчная колика
- Кишечная колика
- Кишечные колики
- Почечная колика

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— дыхательная недостаточность;

— пожилой возраст;

— кахексия;

— травма черепа;

— геморрагический инсульт;

— острые заболевания внутренних органов до установления диагноза;

— беременность.

Способ применения и дозы:

П/к, **взрослым** - по 1 мл 1-2% раствора. Высшие дозы: разовая - 0.03 г, суточная - 0.1 г.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, запоры, угнетение дыхательного центра, задержка мочи, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказание — беременность.

Особые указания и меры предосторожности:

Могут развиться привыкание и наркотическая зависимость.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в пожилом возрасте

Противопоказание — пожилой возраст.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Omnopon