

Онихелп



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Лак для ногтей** прозрачный, от бесцветного до бледно-желтого цвета.

	1 мл
аморолфина гидрохлорид	55.74 мг,
что соответствует содержанию аморолфина	50 мг

Вспомогательные вещества: этанол - 482.53 мг, этилацетат - 144.59 мг, эудрагит RL 100 (сополимер метилметакрилата, триметиламмониетилметакрилата хлорида и этилакрилата [2:0.2:1]) - 127.6 мг, н-бутилацетат - 50.08 мг, триацетин - 10.45 мг.

2.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с аппликаторами (10 шт.), пилками для ногтей (60 шт.), спиртовыми салфетками (30 шт.) - пачки картонные.

5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с аппликаторами (10 шт.), пилками для ногтей (60 шт.), спиртовыми салфетками (30 шт.) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковое средство для наружного применения. Обладает фунгистатическим и фунгицидным действием. Повреждает клеточную мембрану грибов, в основном за счет нарушения синтеза стеролов. Снижает содержание эргостерола, вызывает накопление аномальных неплоскостных стереоизомеров стеролов. Активен в отношении дрожжевых грибов рода *Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Malassezia* spp., *Cryptococcus* spp., дерматофитов (*Trichophyton* spp., *Microsporum* spp., *Epidermophyton* spp.), плесневых грибов (*Altemaria*, *Hendersonula*, *Scopulariopsis*), грибов *Dematiaceae* (*Cladosporium*, *Fonsecaea*, *Wangiella*), диморфных грибов (*Coccidioides*, *Histoplasma* spp., *Sporothrix*) и актиномицетов.

Фармакокинетика

При наружном применении в соответствующих лекарственных формах системная абсорбция незначительна.

Показания к применению:

Онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами (в том случае если поражено не более 2/3 ногтевой пластинки). Профилактика грибковых поражений ногтей.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)

Противопоказания:

Период новорожденности и ранний детский возраст, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к аморолфину.

Способ применения и дозы:

Применяют наружно. Доза и длительность лечения зависят от показаний и используемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Местные реакции: жжение, гиперемия, зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения не рекомендуется пользоваться косметическим лаком для ногтей или накладными ногтями. При работе с органическими растворителями следует надевать непроницаемые перчатки. Пилки, использованные для обработки пораженных ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Onihelp>