

Орлистат



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Орлистат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Капсулы твердые желатиновые № 0, с корпусом и крышечкой синего цвета, непрозрачные; содержимое капсул - белые или почти белые пеллеты.

	1 капс.
орлистат (субстанция-пеллеты 50%)	120 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 98.64 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 10.08 мг, натрия лаурилсульфат - 6.24 мг, повидон К30 - 5.04 мг.

Состав корпуса капсулы: краситель синий патентованный - 0.2786%, титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

Состав крышечки капсулы: краситель синий патентованный - 0.2786%, титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (7) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (8) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (9) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (14) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (7) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (8) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (9) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки ячейковые контурные (14) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (7) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (8) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (9) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (14) - пачки картонные.
10 шт. - банки (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки (1) - пачки картонные.
21 шт. - банки (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки (1) - пачки картонные.
40 шт. - банки (1) - пачки картонные.
42 шт. - банки (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки (1) - пачки картонные.
80 шт. - банки (1) - пачки картонные.
84 шт. - банки (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки (1) - пачки картонные.
120 шт. - банки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ингибитор липаз. При приеме внутрь орлистат ингибирует желудочную и панкреатическую липазы. В результате нарушается расщепление пищевых жиров и уменьшается их всасывание из ЖКТ. При систематическом применении указанный эффект приводит к уменьшению массы тела у больных с ожирением. Орлистат практически не всасывается из ЖКТ и в связи с этим практически не оказывает резорбтивного действия.

Показания к применению:

Ожирение (в сочетании с диетой умеренной калорийности).

Противопоказания:

Синдром хронической мальабсорбции, повышенная чувствительность к орлистату.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь по 120 мг во время каждого основного приема пищи или в течение часа после еды, обычно не более 3 раз/сут. Если пища содержит мало жиров, прием орлистата можно пропустить.

Побочное действие:

Возможно: маслянистые выделения из прямой кишки, метеоризм, "жирный" стул, частая дефекация, императивные позывы на дефекацию, недержание кала.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С особой осторожностью применяют орлистат при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Аденогенитальный синдром
- Акромегалия
- Гестационный сахарный диабет
- Гинекомастия у мужчин

Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо иметь в виду, что частота и выраженность побочных эффектов повышаются при увеличении содержания в пище жиров. При уменьшении содержания жиров в пище вероятность возникновения побочных эффектов уменьшается. Рекомендуется, чтобы потребляемое в сутки количество жиров достаточно равномерно распределялось на все приемы пищи.

В процессе лечения по мере снижения массы тела возможно улучшение течения часто сопутствующих ожирению патологических процессов, в т.ч. артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушений липидного обмена.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Orlistat>