Орнидазол-Веро



Код АТХ:

- G01AF06

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Орнидазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе видны два слоя.

	1 таб.
орнидазол	500 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 96.58 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 33.42 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 42 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) - 21 мг, магния стеарат - 7 мг.

Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 8.58 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 5.36 мг, полисорбат (твин-80) - 1.88 мг, тальк - 2.3 мг, титана диоксид - 1.88 мг.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопротозойный препарат с антибактериальной активностью.

Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы орнидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа орнидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот,что ведет к гибели бактерий.

Активен в отношении Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica; облигатных *анаэробных микроорганизмов:* Bacteroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus,

Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonela spp., Prevotella spp. (Prevotella bivia, Prevotella buccae, Prevotella disiens); *грамположительных микроорганизмов:* Eubacterium spp., Clostridium spp.

К препарату *не чувствительны* аэробные микроорганизмы.

Фармакокинетика

Всасывание

Хорошо всасывается из ЖКТ. Биодоступность - 90%. Время достижения C_{max} - 1-2 ч.

Распределение

Проникает через ГЭБ. Связывание с белками плазмы - не менее 15%.

Метаболизм

Метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и глюкуронирования.

Выведение

Выводится в виде метаболитов с мочой (60-65%) и калом (20-22)%. Около 5% выводится внеизмененном виде. $T_{1/2}$ составляет 13 ч.

Показания к применению:

— трихомониаз;

— амебиаз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз (в т.ч. амебный абсцесс печени);

— лямблиоз;

— профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями, при операциях на ободочной кишке и в гинекологии.

Относится к болезням:

- Абсцесс
- Абсцесс печени
- Амебиаз
- Амебная дизентерия
- Дизентерия
- Инфекции
- Трихомониаз

Противопоказания:

— органические заболевания ЦНС;

— I триместр беременности;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышеная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к производным нитроимидазола).

Способ применения и дозы:

Таблетки принимают внутрь после еды.

При *трихомониазе* **взрослым** назначают по 500 мг 2 раза/сут в течение 5 дней. **Детям** дозу устанавливают из расчета 25 мг/кг массы тела 1 раз/сут однократно.

При *амебной дизентерии* **взрослым** и **детям с массой тела более 35 кг** назначают по 1.5 г 1 раз/сут, с **массой тела более 60 кг** - 2 г/сут. **Детям с массой тела менее 35 кг** суточную дозу устанавливают из расчета 40 мг/кг массы тела. Курс лечения – 3 дня.

При *других формах амебиаза* **взрослым и детям с массой тела более 35 кг** – по 500 мг 2 раза/сут, **детям с массой тела до 35 кг** – 25 мг/кг однократно в течение 5-10 дней.

При *лямблиозе* **взрослым и детям с массой тела более 35 кг** – по 1.5 г 1 раз/сут, **детям с массой тела менее 35 кг** – по 40 мг/кг/сут. Продолжительность терапии составляет 1-2 дня.

Для *профилактики послеоперационных инфекций, вызванных анаэробными бактериями*, назначают по 500 мг, затем каждые 12 ч по 500 мг в течение 3-5 дней.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение сознания, тремор, ригидность, дискоординация движений, судороги, сенсорная или смешанная периферическая невропатия.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Передозировка:

Симптомы: эпилептиформные судороги, депрессия, периферический неврит.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан в I триместре беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Орнидазол-веро усиливает эффект антикоагулянтов кумаринового ряда, пролонгирует миорелаксирующее действие векурония бромида.

При одновременном применении с этанолом не ингибирует ацетальдегиддегидрогеназу (в отличие от других производных имидазола.

Особые указания и меры предосторожности:

При лечении трихомониаза следует проводит одновременное лечение обоих половых партнеров.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ornidazol-Vero