

Орнитин Канон



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Орнитин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь** в виде смеси гранул и порошка почти белого или белого с желтоватым оттенком цвета с запахом лимона и мяты.

	1 пак. (5 г)
L-орнитина L-аспартат	3 г

Вспомогательные вещества: ароматизатор лимонный - 0.015 г, ароматизатор мятный - 0.005 г, аспартам - 0.05 г, лимонная кислота безводная - 0.5 г, маннитол - 1.43 г.

5 г - Пакетики из комбинированного материала (10) - пачки картонные.

5 г - Пакетики из комбинированного материала (30) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гипоаммониемическое средство. Снижает повышенный уровень аммиака в организме, в частности при заболеваниях печени. Действие связано с участием в орнитиновом цикле мочевинообразования Кребса (образование мочевины из аммиака). Способствует выработке инсулина и соматотропного гормона. Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания.

Орнитина аспартат в организме диссоциирует на аминокислоты орнитин и аспартат, которые всасываются в тонкой кишке путем активного транспорта через кишечный эпителий. Выводится с мочой.

Показания к применению:

Острые и хронические заболевания печени, сопровождающиеся гипераммониемией. Печеночная энцефалопатия.

Для динамического изучения функции гипофиза.

В качестве корректирующей добавки к препаратам для парентерального питания у пациентов с белковой недостаточностью.

Относится к болезням:

- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

Выраженные нарушения функции почек (содержание сывороточного креатинина более 3 мг/100 мл).

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь - по 3-6 г 3 раза/сут после еды. В/м - 2-6 г/сут; в/в струйно 2-10 г/сут; кратность введения - 1-2 раза/сут. В/в капельно 10-50 г/сут. Длительность инфузии, частота и продолжительность лечения определяются индивидуально.

Побочное действие:

Редко: кожные проявления.

В отдельных случаях: тошнота, рвота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности применение возможно только под строгим наблюдением врача.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

Источник: http://drugs.thead.ru/Ornitin_Kanon