

## [Орсотен слим](#)



### **Код АТХ:**

- [A08AB01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Орлистат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Капсулы 7 или 21 шт. в контурной ячейковой упаковке, в пачке картонной 1, 2, 3, 4, 6, 12 шт.

### **Состав:**

#### **1 капсула содержит:**

*Активное вещество:* орсотен полуфабрикат-гранулы 112,8 мг

*Вспомогательные вещества:* МКЦ 22,2 мг

*Оболочка капсулы:* титана диоксид (E171) 0,58 мг; желатин 28,22 мг, оксид железа желтый (E172) 0,04 мг.

### **Описание:**

Капсулы от белого до белого с желтоватым оттенком цвета; содержимое капсул - микрогранулы или смесь порошка и микрогранул белого или почти белого цвета; допускается наличие слежавшихся агломератов, легко рассыпающихся при надавливании.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Ингибитор липаз. При приеме внутрь орлистат ингибирует желудочную и панкреатическую липазы. В результате нарушается расщепление пищевых жиров и уменьшается их всасывание из ЖКТ. При систематическом применении указанный эффект приводит к уменьшению массы тела у больных с ожирением. Орлистат практически не всасывается из ЖКТ и в связи с этим практически не оказывает резорбтивного действия.

## Показания к применению:

Ожирение (в сочетании с диетой умеренной калорийности).

## Относится к болезням:

- [Ожирение](#)

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- ипперчувствительность;
- синдром хронической мальабсорбции;
- холестаза.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 капс. (60 мг) 3 раза в день, запивая водой, непосредственно перед, во время или в течение 1 ч после каждого приема пищи.

Если прием пищи пропущен или пища не содержала жира, применение орлистата следует пропустить.

В течение 24 ч можно принять не более трех капсул по 60 мг препарата Орсотен® слим. Курс лечения не должен превышать 6 мес.

Если через 12 нед применения препарата Орсотен® слим снижение массы тела не происходит (не более 5% от первоначальной массы), пациенту следует проконсультироваться с врачом для решения вопроса о целесообразности дальнейшего применения.

Диета и физические упражнения являются важным компонентом программы снижения массы тела. Рекомендуется начинать диетическую программу и физические упражнения до начала терапии Орсотеном® слим.

Во время применения препарата Орсотен® слим пациент должен получать умеренно гипокалорийную диету со сбалансированным содержанием питательных веществ, в которой приблизительно 30% составляют жиры (например, при калорийности 2000 ккал в сутки пища должна содержать не более 67 г жира). Суточное потребление жиров, углеводов и белка должно быть распределено между тремя основными приемами пищи. Программа диеты и физических упражнений должна быть продолжена и после того, как применение препарата Орсотен® слим будет прекращено.

Данные о применении орлистата у пожилых людей ограничены.

Эффекты орлистата у лиц с нарушением функции печени и/или почек не изучены, однако учитывая, что всасывание орлистата минимально, коррекция дозы у пожилых людей и у лиц с нарушением функции печени и/или почек не требуется.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* маслянистые выделения из прямой кишки, метеоризм, "жирный" стул, частая дефекация, императивные позывы на дефекацию, недержание кала.

## **Передозировка:**

О случаях передозировки препарата Орсотен слим не сообщалось.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Адекватных хорошо контролируемых исследований орлистата у беременных женщин не проводилось. Поскольку данные испытаний на животных не всегда могут предопределить ответную реакцию у человека, орлистат не рекомендуется применять во время беременности.

Категория действия на плод по FDA — В.

Неизвестно, секретируется ли орлистат в грудное молоко, не следует применять его у кормящих женщин.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Показано, что орлистат приводит к уменьшению всасывания из ЖКТ бетакаротена,  $\alpha$ -токоферола.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Необходимо иметь в виду, что частота и выраженность побочных эффектов повышаются при увеличении содержания в пище жиров. При уменьшении содержания жиров в пище вероятность возникновения побочных эффектов уменьшается. Рекомендуется, чтобы потребляемое в сутки количество жиров достаточно равномерно распределялось на все приемы пищи.

В процессе лечения по мере снижения массы тела возможно улучшение течения часто сопутствующих ожирению патологических процессов, в т.ч. артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушений липидного обмена.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Orsoten\\_slim](http://drugs.thead.ru/Orsoten_slim)