

[Ортосифона тычиночного \(Почечного чая\) листья](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ортосифона тычиночного листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Диуретическое средство растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ листьев почечного чая (гликозид ортосифонин, сапонины, дубильные вещества, эфирные и жирные масла, органические кислоты, соли и др.) обладает мочегонными, спазмолитическими свойствами, повышает секреторную активность слизистой оболочки желудка. Мочегонный эффект сопровождается выведением с мочой из организма хлоридов, мочевины и мочевой кислоты.

Показания к применению:

Отеки; мочекаменная болезнь; холециститы, желчнокаменная болезнь.

Относится к болезням:

- [Желчнокаменная болезнь](#)
- [Мочекаменная болезнь](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

Не выявлены.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя (3-10 г сырья на 200 мл воды) по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Почечный чай эффективен при длительном применении (в течение 4-6 мес). Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 сут.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ortosifona_tychinochnogo_Pochechnogo_chaya_listya