Орвис Иммуно

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки, покрытые пленочной оболочкой*** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе ядро оранжевого цвета с вкраплениями белого и оранжевого цвета.

	1 таб.
тилорона дигидрохлорид	125 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат (кальция фосфат двузамещенный безводный) - 78 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 76 мг, кроскармеллоза натрия - 15 мг, повидон К30 - 3 мг, магния стеарат - 1.5 мг, стеариновая кислота - 1.5 мг.

Состав пленочной оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 6.17 мг, титана диоксид - 1.85 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 1.24 мг. полисорбат 80 - 0.62 мг, краситель солнечный закат желтый - 0.12 мг.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
6 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Низкомолекулярный индуктор эндогенного интерферона. Является синтетическим соединением ароматического ряда, относится к классу флуоренонов. Стимулирует образование в организме интерферонов альфа, бета, гамма. Основными структурами, продуцирующими интерферон в ответ на введение тилорона, являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты, гранулоциты. После приема внутрь максимум продукции интерферона определяется в последовательности кишечник-печень-кровь через 4-24 ч. В лейкоцитах человека тилорон индуцирует образование интерферона, уровень которого в крови составляет 250 ЕД/мл.

Оказывает иммуномодулирующее действие: стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы усиливает антителообразование, повышает соотношение высокоавидные/низкоавидные антитела, уменьшает степень иммунодепрессии, восстанавливает соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии: вирусные гепатиты A, B и C; инфекции, вызванные вирусами Herpes simplex типа 1 и 2, Varicella zoster, цитомегаловирусами; инфекционно-аллергические и вирусные энцефаломиелиты (рассеянный склероз, лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты); урогенитальный и респираторный хламидиоз; негонококковые уретриты; туберкулеза легких.

Лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ.

Относится к болезням:

- Аллергия
- Гепатит
- Гепатоз
- Грипп
- Инфекции
- Лейкоз
- ОРВИ
- Рассеянный склероз
- Склерит
- Туберкулез
- Уретрит
- Энцефалит

Противопоказания:

Беременность, лактация (грудное вскармливание), детский возраст до 7 лет, повышенная чувствительность к тилорону.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь суточная доза составляет 125-250 мг. Частота приема и длительность применения зависят от показаний и схемы лечения.

Побочное действие:

Возможно: кратковременный озноб, аллергические реакции.

В отдельных случаях: диспептические симптомы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Тилорон противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Тилорон совместим с антибиотиками, средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Амебиаз
- Аскаридоз
- Бешенство
- Болезнь Лайма

Источник: http://drugs.thead.ru/Orvis_Immuno