Орвитол Нп



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** бесцветные прозрачные №3. Содержимое капсул - порошок белого цвета с оттенком от кремового до серовато-бежевого.

	1 капс.
этилового эфира 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-диметиламинометил-2-фенилтиометилиндол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (умифеновир)	50 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат 9.275 мг, магния стеарат 1.3 мг, целлюлоза микрокристаллическая 56.625 г, кремния диоксид коллоидный 1.05 мг.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (4) - пачки картонные.

◊ ***Капсулы*** бесцветные прозрачные №1. Содержимое капсул - порошок белого цвета с оттенком от кремового до серовато-бежевого.

	1 капс.
этилового эфира 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-диметиламинометил-2-фенилтиометилиндол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (умифеновир)	100 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфата дигидрат 18.445 мг, магния стеарат 2.615 мг, целлюлоза микрокристаллическая 113.245 г, кремния диоксид коллоидный 2.095 мг.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (3) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противовирусное средство, оказывает иммуномодулирующее и противогриппозное действие, специфически подавляет вирусы гриппа А и В, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

Противовирусное действие обусловлено подавлением слияния липидной оболочки вируса с клеточными мембранами при контакте вируса с клеткой.

Обладает интерферониндуцирующими свойствами, стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета,

фагоцитарную функцию макрофагов, повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

Терапевтическая эффективность, за счет подавления вирусов гриппа и ОРВИ, проявляется в уменьшении выраженности интоксикации и катаральных явлений, периода лихорадки и общей продолжительности заболевания.

Предупреждает развитие постгриппозных осложнений, снижает частоту обострений хронических бактериальных заболеваний.

Фармакокинетика

Абсорбция - быстрая. Быстро распределяется по органам и тканям. $ТС_{max}$ при приеме в дозе 50 мг -1.2 ч, 100 мг - 1.5 ч. Метаболизируется в печени. $Т_{1/2}$ 17-21 ч. Около 40% выводится в неизмененном виде, в основном через кишечник (38.9%) и в незначительном количестве почками (0.12%). В течение первых суток выводится 90% от введенной дозы.

Показания к применению:

Профилактика и лечение у взрослых и детей:

— грипп А и В, ОРВИ (в т.ч. осложненные бронхитом, пневмонией); вторичные иммунодефицитные состояния, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);

— комплексная терапия хронического бронхита, пневмонии и рецидивирующей герпетической инфекции;

— профилактика послеоперационных инфекционных осложнений и нормализация иммунного статуса у взрослых;

— в составе комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 3 лет (50 мг) и детей старше 6 лет (100 мг).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Герпес
- Грипп
- Инфекции
- Пневмония

Противопоказания:

— детский возраст (до 3 лет);

— беременность и период лактации;

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, до приема пищи.

Для неспецифической профилактики:

- *при непосредственном контакте с больными гриппом и другими ОРВИ:* **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 1 раз в день в течение 10-14 дней;

- *в период эпидемии гриппа и других ОРВИ, для предупреждения обострений хронического бронхита, рецидива герпетической инфекции:* **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** -100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Для лечения:

- *грипп, другие ОРВИ без осложнений:* **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 4 раза в день (каждые 6 часов) в течение 5 дней;

- *грипп, другие ОРВИ с развитием осложнений (бронхит, пневмония и др.):* **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 3 раза в день в течение 5 дней, затем разовую дозу 1 раз в неделю в течение 3-4 недель.

В комплексной терапии хронического бронхита, герпетической инфекции: **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 3 раза в день в течение 5 дней, затем разовую дозу 2 раза в неделю в течение 3-4 недель.

Профилактика послеоперационных осложнений: **взрослым** - 200 мг за 2 суток до операции, затем по 200 мг на 2 и 5 сутки после операции.

В составе *комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии* **детям старше 12 лет и взрослым** назначают по 200 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней, в возрасте от 6 до 12 лет - по 100 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней, в возрасте от 3 до 6 лет - по 50 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней.

Побочное действие:

Редко аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не было отмечено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не проявляет центральной нейротропной активности, прием препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 3 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Orvitol_Np