

## Орвитол Нп



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капсулы** бесцветные прозрачные №3. Содержимое капсул - порошок белого цвета с оттенком от кремового до серовато-бежевого.

	<b>1 капс.</b>
этилового эфира 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-диметиламинометил-2-фенилтиометилиндол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (умифеновир)	50 мг

*Вспомогательные вещества:* кальция гидрофосфата дигидрат 9.275 мг, магния стеарат 1.3 мг, целлюлоза микрокристаллическая 56.625 г, кремния диоксид коллоидный 1.05 мг.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (3) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (4) - пачки картонные.

◇ **Капсулы** бесцветные прозрачные №1. Содержимое капсул - порошок белого цвета с оттенком от кремового до серовато-бежевого.

	<b>1 капс.</b>
этилового эфира 6-бром-5-гидрокси-1-метил-4-диметиламинометил-2-фенилтиометилиндол-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат (умифеновир)	100 мг

*Вспомогательные вещества:* кальция гидрофосфата дигидрат 18.445 мг, магния стеарат 2.615 мг, целлюлоза микрокристаллическая 113.245 г, кремния диоксид коллоидный 2.095 мг.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (1) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (3) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры ПВХ/Алюминий (4) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Противовирусное средство, оказывает иммуномодулирующее и противогриппозное действие, специфически подавляет вирусы гриппа А и В, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

Противовирусное действие обусловлено подавлением слияния липидной оболочки вируса с клеточными мембранами при контакте вируса с клеткой.

Обладает интерферониндуцирующими свойствами, стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета,

фагоцитарную функцию макрофагов, повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

Терапевтическая эффективность, за счет подавления вирусов гриппа и ОРВИ, проявляется в уменьшении выраженности интоксикации и катаральных явлений, периода лихорадки и общей продолжительности заболевания.

Предупреждает развитие постгриппозных осложнений, снижает частоту обострений хронических бактериальных заболеваний.

#### **Фармакокинетика**

Абсорбция - быстрая. Быстро распределяется по органам и тканям.  $T_{C_{max}}$  при приеме в дозе 50 мг - 1.2 ч, 100 мг - 1.5 ч. Метаболизируется в печени.  $T_{1/2}$  17-21 ч. Около 40% выводится в неизменном виде, в основном через кишечник (38.9%) и в незначительном количестве почками (0.12%). В течение первых суток выводится 90% от введенной дозы.

### **Показания к применению:**

Профилактика и лечение у взрослых и детей:

- грипп А и В, ОРВИ (в т.ч. осложненные бронхитом, пневмонией); вторичные иммунодефицитные состояния, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);
- комплексная терапия хронического бронхита, пневмонии и рецидивирующей герпетической инфекции;
- профилактика послеоперационных инфекционных осложнений и нормализация иммунного статуса у взрослых;
- в составе комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии у детей старше 3 лет (50 мг) и детей старше 6 лет (100 мг).

### **Относится к болезням:**

- [Бронхит](#)
- [Герпес](#)
- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)
- [Пневмония](#)

### **Противопоказания:**

- детский возраст (до 3 лет);
- беременность и период лактации;
- гиперчувствительность.

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь, до приема пищи.

Для неспецифической профилактики:

- при непосредственном контакте с больными гриппом и другими ОРВИ: **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 1 раз в день в течение 10-14 дней;

- в период эпидемии гриппа и других ОРВИ, для предупреждения обострений хронического бронхита, рецидива герпетической инфекции: **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Для лечения:

- грипп, другие ОРВИ без осложнений: **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 4 раза в день (каждые 6 часов) в течение 5 дней;

- грипп, другие ОРВИ с развитием осложнений (бронхит, пневмония и др.): **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 3 раза в день в течение 5 дней, затем разовую дозу 1 раз в неделю в течение 3-4 недель.

## Орвитол Нп

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В комплексной терапии хронического бронхита, герпетической инфекции: **детям от 3 до 6 лет** - 50 мг, **от 6 до 12 лет** - 100 мг, **старше 12 лет и взрослым** - 200 мг 3 раза в день в течение 5 дней, затем разовую дозу 2 раза в неделю в течение 3-4 недель.

Профилактика послеоперационных осложнений: **взрослым** - 200 мг за 2 суток до операции, затем по 200 мг на 2 и 5 сутки после операции.

В составе комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии **детям старше 12 лет и взрослым** назначают по 200 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней, в возрасте от 6 до 12 лет - по 100 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней, в возрасте от 3 до 6 лет - по 50 мг 4 раза в день (каждые 6 ч) в течение 5 дней.

### Побочное действие:

Редко аллергические реакции.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не было отмечено.

### Особые указания и меры предосторожности:

Не проявляет центральной нейротропной активности, прием препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 3 лет.

### Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

### Срок годности:

3 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Orvitol\\_Np](http://drugs.thead.ru/Orvitol_Np)