# Осарбон

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Суппозитории вагинальные*** | **1 супп.** |
|---|---|
| ацетарсол | 250 мг |
| борная кислота | 300 мг |
| декстроза | 300 мг |

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Ацесартол, благодаря способности блокировать сульфгидрильные ферментные системы, нарушает обменные процессы простейших (в т.ч. трихомонад, амеб), некоторых спирохет. Для предупреждения резорбции препарата (и возможной интоксикации) необходимо поддержание кислой среды влагалища.

Глюкоза (дестроза), входящая в состав препарата, является питательным субстратом для лактобацилл нормальной вагинальной микрофлоры.

Лактобациллы разлагают глюкозу с образованием молочной кислоты, обеспечивая кислую среду влагалища.

Борная кислота также поддерживает кислую среду влагалища.

## Показания к применению:

— трихомонадный кольпит.

## Относится к болезням:

- Кольпит
- Кольпит

## Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— сахарный диабет;

— геморрагический диатез;

— туберкулез;

— беременность.

## Способ применения и дозы:

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. Применяют по 1 суппозиторию 1 раз/сут в течение 10 дней.

## Побочное действие:

Аллергические реакции, гепатит, полиневрит.

## Передозировка:

При применении препарата Осарбон интравагинально случаев передозировки не отмечалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказн при беременности.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата до настоящего времени не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и работу с машинами и оборудованием.

***При нарушениях функции почек***

Препарат противопоказан при почечной недостаточности.

***При нарушениях функции печени***

Препарат противопоказан при печеночной недостаточности.

## Условия хранения:

Список А. В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Osarbon