

Осарцид



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противопротозойное средство. Блокируя сульфгидрильные ферментные системы, нарушает обменные процессы у простейших (в т.ч. трихомонад, амеб), а также некоторых спирохет. Для снижения резорбции препарата (и риска развития возможной интоксикации) необходимо поддержание кислой среды влагалища.

Декстроза, входящая в состав препарата, является питательным субстратом для лактобацилл нормальной вагинальной микрофлоры. Лактобациллы разлагают декстрозу с образованием молочной кислоты, обеспечивают кислую среду влагалища.

Борная кислота также поддерживает кислую среду влагалища.

Сульфаниламид - бактериостатическое средство, механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с ПАБК и угнетением активности дигидроптероатсинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты и в результате - к нарушению синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов.

Показания к применению:

— трихомонадный кольпит.

Относится к болезням:

- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- нарушения функции почек;
- сахарный диабет;
- геморрагический диатез;
- туберкулез;

— беременность.

Способ применения и дозы:

Интравагинально (предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки при помощи ножниц, разрезав пленку по контуру суппозитория) - 1 суппозиторий 1 раз/сут, в течение 10 дней. Процедуру производят в положении лежа.

Побочное действие:

Желтуха, гепатит, полиневрит, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушении функции почек.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Osarcid>