Отхаркивающий сбор



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Багульника болотного побеги
- Девясила корневища с корнями
- Календулы лекарственной цветки
- Мать-и-мачехи листья
- Мяты перечной листья
- Подорожника большого листья
- Ромашки аптечной цветки
- Солодки корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сырье растительное - порошок***	**100 г**
корни и корневища девясила высокого	10 г
листья мать-и-мачехи	10 г
листья подорожника большого	10 г
цветки календулы лекарственной	10 г
цветки ромашки	10 г
корни солодки голой	15 г
побеги багульника болотного	15 г
листья мяты перечной	20 г

1.5 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
1.5 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой сбора оказывает отхаркивающее, бронхолитическое и противовоспалительное действие; обладает слабыми седативными свойствами.

Показания к применению:

В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, бронхит, трахеобронхит).

Относится к болезням:

- Бронхит
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

3 фильтр-пакета (4.5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 20 минут, периодически надавливая на фильтр-пакеты ложечкой, затем фильтр-пакеты отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/3 стакана 4 раза в день до еды. Курс лечения 10-15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции. Возможны изжога, тошнота, диарея.

Передозировка:

Возможно усиление выраженности таких побочных эффектов, как изжога, тошнота, диарея. *Лечение:* симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности, в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сбор не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Otharkivayushchiy_sbor