

Отинум



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Холина салицилат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли ушные** в виде прозрачного раствора, слабо окрашенного в желтый цвет, с характерным запахом.

холина салицилат	1 мл 200 мг
------------------	----------------

Вспомогательные вещества: глицерол, этанол, хлорбутанол гемигидрат, вода очищенная.

10 г - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) с навинчивающейся крышкой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

НПВС. Холина салицилат является производным салициловой кислоты, при закапывании в ухо оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Действие холина салицилата основано на угнетении активности циклооксигеназы - фермента, отвечающего за синтез простагландинов. Холина салицилат также угнетает синтез тромбксана и простаглицлина.

Обладает также противомикробным и противогрибковым действием (в кислой и щелочной среде).

При местном применении не оказывает системного действия.

Показания к применению:

— острый средний отит, мирингит, наружный отит;

— перед промыванием наружного слухового прохода для размягчения затвердевшей ушной серы перед процедурой ее удаления.

Относится к болезням:

- [Отит](#)

Противопоказания:

— полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в т.ч. в анамнезе);

— нарушение целостности барабанной перепонки;

— беременность и период лактации (в связи с отсутствием данных);

— детский возраст (в связи с отсутствием данных);

— повышенная чувствительность к холина салицилату и другим компонентам препарата.

С осторожностью: аллергический ("сенный") насморк, полипы слизистой оболочки носовых ходов.

Способ применения и дозы:

При *остром среднем отите, мирингите и наружном отите* закапывают в наружный слуховой проход по 3-4 капли 3-4 раза в сутки. Курс лечения составляет не более 10 дней.

Для *размягчения "серных пробок" перед их удалением* закапывают по 3-4 капли в наружный слуховой проход 2 раза в сутки на протяжении четырех дней.

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо.

Капли следует закапывать больному, лежащему на боку; после процедуры больной должен в течение нескольких минут оставаться в том же положении.

Нет необходимости изменять режим дозирования для лиц **пожилого возраста** и больных с **нарушениями функции печени и почек**.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, чувство жжения.

При длительном применении, а также у больных с перфорацией барабанной перепонки может наступить нарушение слуха.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием данных противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие других противовоспалительных, жаропонижающих и анальгезирующих средств.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Отинум не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.

При нарушениях функции почек

Нет необходимости изменять режим дозирования для с **нарушениями функции почек**.

При нарушениях функции печени

Нет необходимости изменять режим дозирования для больных с **нарушениями функции печени**

Применение в пожилом возрасте

Нет необходимости изменять режим дозирования для лиц **пожилого возраста**.

Применение в детском возрасте

В связи с отсутствием данных противопоказано применение у детей

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступных детям местах.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Otinum>