

## Отипакс



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лидокаин](#)
- [Феназон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Капли ушные** прозрачные, бесцветные или желтоватого цвета, с запахом спирта.

	<b>1 г</b>
феназон	40 мг
лидокаина гидрохлорид	10 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия тиосульфат, этанол, глицерол, вода.

16 г - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельницей (в блистере) - коробки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное действие.

*Феназон* - анальгетик-антипиретик с противовоспалительным и анальгезирующим действием.

*Лидокаин* - местный анестетик. Комбинация феназона и лидокаина способствует более быстрому наступлению анестезии, а также увеличивает ее интенсивность и длительность.

#### Фармакокинетика

## Отипакс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Не проникает в организм при неповрежденной барабанной перепонке.

### Показания к применению:

Для местного симптоматического лечения и обезболивания у взрослых и детей (включая новорожденных) при:

- среднем отите в остром периоде в момент воспаления;
- отите, как осложнении после гриппа;
- баротравматическом отите.

### Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Грипп](#)
- [Отит](#)

### Противопоказания:

- перфорация барабанной перепонки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Капли закапывают в наружный слуховой проход по 3-4 капли 2-3 раза/сут. Во избежание соприкосновения холодного раствора с ушной раковиной флакон перед применением следует согреть в ладонях.

Курс лечения составляет не более 10 дней.

### Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции, раздражение и гиперемия слухового прохода.

### Передозировка:

Данные о передозировке препарата Отипакс не предоставлены.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Отипакс при беременности и в период лактации по показаниям при условии неповрежденной барабанной перепонки.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время данные о взаимодействии препарата Отипакс с другими лекарственными средствами отсутствуют.

### Особые указания и меры предосторожности:

Перед началом применения препарата необходимо убедиться в целостности барабанной перепонки. В случае применения препарата при перфорированной барабанной перепонке возможно развитие осложнений из-за контакта активного вещества с компонентами системы среднего уха.

**Отипакс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Следует иметь в виду, что препарат содержит активное вещество, которое может дать положительный тест при допинг-контроле.

**Условия хранения:**

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 6 месяцев.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Otipaks>