# Отирелакс




## Код АТХ:

- S02D

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Феназон

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Капли ушные*** в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора.

| | **1 г** |
|---|---|
| феназон | 40 мг |
| лидокаина гидрохлорид | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* натрия тиосульфата пентагидрат, этанол 96%, глицерол, натрия гидроксид (раствор 1М), вода очищенная.

15 мл (17.1 г) - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное действие.

Феназон - анальгетик-антипиретик с противовоспалительным и анальгезирующим действием. Лидокаин - местный анестетик. Комбинация феназона и лидокаина способствует более быстрому наступлению анестезии, а также увеличивает ее интенсивность и длительность.

***Фармакокинетика***

Действующие вещества не всасываются в системный кровоток при неповрежденной барабанной перепонке.

## Показания к применению:

Для местного симптоматического лечения и обезболивания у взрослых и детей (включая новорожденных) при:

— наружном отите;

— в комплексной терапии среднего отита с неповрежденной барабанной перепонкой;

— баротравматическом отите.

## Относится к болезням:

- Отит

## Противопоказания:

— перфорация барабанной перепонки;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная чувствительность к производным пиразолона.

## Способ применения и дозы:

Капли закапывают в наружный слуховой проход по 3-4 капли 2-3 раза/сут. Во избежание соприкосновения холодного раствора с ушной раковиной флакон перед применением следует согреть в ладонях.

Курс лечения не должен превышать 10 сут.

## Побочное действие:

*Возможно:* местные аллергические реакции, раздражение и гиперемия слухового прохода, незначительная боль во время применения.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Отирелакс не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время информация о взаимодействии препарата Отирелакс с другими лекарственными средствами отсутствуют.

## Особые указания и меры предосторожности:

Необходимо убедиться в целостности барабанной перепонки перед началом применения препарата. В случае применения препарата при перфорированной барабанной перепонке, активные вещества могут проникать в системный кровоток, что может привести к возникновению осложнений.

Продолжительность применения Отирелакса не более 10 дней, после чего следует провести коррекцию назначенной терапии.

При использовании препарата Отирелакс в сочетании с другими ушными каплями необходимо сохранять интервал минимум в 30 мин между закапываниями.

Следует иметь в виду, что препарат содержит активный компонент, который может дать положительный тест при допинг-контроле.

***Применение в детском возрасте***

Возможно применение у детей (включая новорожденных)

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 6 месяцев.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Otirelaks