Отофа



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Рифамицин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли ушные 2.6% в виде прозрачного раствора красно-желтого цвета.

	100 мл
рифамицин натрия	2.6 г (2 000 000 МЕ)

Вспомогательные вещества: макрогол 400 - 25 г, аскорбиновая кислота - 500 мг, динатрия эдетат - 12 мг, калия дисульфит - 150 мг, лития гидроксид - 135 мг, вода очищенная - до 100 мл.

10 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной пипеткой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антибиотик из группы рифамицинов для местного применения в оториноларингологии. Механизм действия рифамицина связан с образованием стабильного комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой, который препятствует росту бактерий. *Активен в отношении* большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих развитие инфекционно-воспалительных заболеваний наружного и среднего уха.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Отофа не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания к применению:

Острые и хронические отиты:

— наружный отит;

— острые средние отиты (в т.ч. при перфорации барабанной перепонки);

— хронические средние отиты;

— состояния после оперативных вмешательств на среднем ухе.

Относится к болезням:

- Отит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к рифамицину.

Способ применения и дозы:

Взрослым закапывают в ухо по 5 капель 3 раза/сут или заливают препарат в ухо на несколько минут 2 раза/сут.

Детям закапывают в ухо по 3 капли 3 раза/сут или заливают препарат в ухо на несколько минут 2 раза/сут.

Средняя продолжительность курса терапии - 7 дней.

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо.

Побочное действие:

Редко: кожные аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с низкой степенью системной абсорбции передозировка маловероятна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Отофа при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого лекарственного взаимодействия препарата Отофа с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат придает розовую окраску барабанной перепонке (видимую при отоскопии).

Следует избегать контактов препарата с одеждой, т.к. раствор может оставлять пятна на ткани.

Применение в детском возрасте

Возможно применение по показаниям и в дозах, учитывающих возраст пациента.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Otofa